

Caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2027

Demarcación Hidrográfica del Segura

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA

070.062 Sierra de Almagro

ÍNDICE:

- 1.-IDENTIFICACIÓN
- 2.-CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS
- 3.-CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS
- 4.- ZONA NO SATURADA
- 5.-PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DE ALMACENAMIENTO
- 6.-SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS DEPENDIENTES
- 7.-RECARGA
- 8.-RECARGA ARTIFICIAL
- 9.-EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
- 10.-EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO
- 11.-USOS DEL SUELO Y CONTAMINACIÓN DIFUSA
- 12.-FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL
- 13.-OTRA INFORMACIÓN GRÁFICA Y LEYENDAS DE MAPAS

Introducción

Para la redacción del Plan Hidrológico de la demarcación del Segura del ciclo de planificación 2021/2027, se ha procedido a la revisión y actualización de la ficha de caracterización adicional de la masa subterránea recogida en el Plan Hidrológico del ciclo de planificación 2009/2015 y 2015/2021. Esta decisión y consideración se ha centrado en:

- Análisis de la evolución piezométrica (estado cuantitativo), para recoger los datos piezométricos hasta el año 2020 inclusive.
- Balances de la masa de agua recogidos en el PHDS 2021/27.
- Control y evolución nitratos, salinidad, y sustancias prioritarias así como otros contaminantes potenciales (estado cualitativo, para recoger los datos de las redes de control de Comisaría de aguas hasta el año 2019 inclusive).
- Actualización de presiones difusas por usos del suelo, así como fuentes puntuales de contaminación, para recoger las presiones identificadas en el PHDS 2021/2027.

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (nombre y código)

Sierra de Almagro 070.062

1.- IDENTIFICACIÓN

Clase de riesgo

Cuantitativo

Detalle del riesgo Cuantitativo

Ámbito Administrativo:

Demarcación hidrográfica	Extensión (Km ²)
SEGURA	20,32

CC.AA
Andalucía

Provincia/s
04-Almería

Topografía:


Distribución de altitudes	
Altitud (m.s.n.m)	
Máxima	660
Mínima	210

Modelo digital de elevaciones		
Rango considerado (m.s.n.m)		Superficie de la masa (%)
Valor menor del rango	Valor mayor del rango	
210	340	25
340	420	30
420	510	25
510	660	21


Información gráfica:

Base cartográfica con delimitación de la masa

Mapa digital de elevaciones



Mapa 1.1 Mapa base cartográfica de la masa Sierra de Almagro (070.062)



Mapa 1.2 Mapa digital de elevaciones de la masa Sierra de Almagro (070.062)

2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS

Ámbito geoestructural:

Unidades geológicas
Alpujarride
Unidad Ballabona-Cucharón

Columna litológica tipo:

Litología	Extensión Afloramiento km ²	Rango de espesor (m)		Edad geológica	Observaciones
		Valor menor del rango	Valor mayor del rango		
Areniscas, pizarras, filitas, cuarcitas y yesos		50		Pérmico	
Calizas, dolomías y calcoesquistos. Complejo Ballabona-Cucharón	14,61	50		Triásico	

Origen de la información geológica:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 996, HUERCAL OVERA.
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 997, ÁGUILAS
IGME		2004	(IGME-Sociedad Geológica de España, 2004). GEOLOGÍA DE ESPAÑA.
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

Información gráfica:

Mapa geológico

Cortes geológicos y ubicación

Columnas de sondeos

Descripción geológica en texto

Descripción geológica

La masa comprende los materiales carbonatados y cuarcíticos pertenecientes al complejo Ballabona-Cucharón que afloran en la Sierra de Almagro. La edad de las rocas de la Unidad Almagro es esencialmente Triásico Medio e Inferior.


La Unidad Almagro, con características similares a la Unidad de la Sierra de Enmedio, consta asimismo de dos tramos: Inferior y Superior.

Tramo Inferior. La serie más completa, perteneciente a la base de esta Unidad, se localiza en el sector N. de la Sierra de Almagro y está formada de muro a techo por: filitas y pizarras de tonos rojizos y violáceos, entre los que se intercalan algunos niveles de areniscas del mismo color, con potencia global de unas 50 m. Encima de éstas se sitúa un conjunto formado por la alternancia de cuarcitas y areniscas de color claro, que recuerdan las cuarcitas y areniscas del Paleozoico-Alpujarride Superior; entre ellas, aparecen intercalados niveles de calizas de algunos decímetros de potencia, y hacia la base de la serie cuarcítica hay localmente niveles de metamicroconglomerados o metaareniscas.


Tramo Superior. Está formado por calizas crema, recrystalizadas, entre las que se intercalan niveles de pizarras. La potencia es variable, entre los 50 y 200 m. De la forma como se ha descrito, se presentan ambos tramos, Inferior y Superior, en el sector norte de la Sierra de Almagro y corresponderían con la Unidad de Almagro de los autores de la Escuela Holandesa. En las Sierras de la Almenara, Aguilón y de Almagro (esta última en sus sectores Central y Sur), estos tramos se presentan con características litológicas diferentes; el Tramo Inferior se forma con filitas y areniscas rojas, con intercalaciones de filitas y/o pizarras grises. Los términos cuarcíticos se reducen, aumentando los carbonatados; los yesos abundan, sobre todo en la zona Central y Sur de la Sierra de Almagro. En cuanto a los Tramos Superiores, se puede significar que los calcoesquistos amarillos, semejantes a los de la Sierra de Enmedio y los niveles de filitas, predominan sobre las calizas masivas recrystalizadas. Estos materiales o conjuntos litológicos corresponden a los que forman las Unidades Ballabona y Cucharón, de la Escuela Holandesa.

Una constante litológica de todas las Unidades Intermedias es la presencia de diabasas y/o metabasitas y yesos. Las primeras, muy abundantes en la Sierra de Enmedio, en menor escala en la Sierra de Almagro y casi apenas en la de Almenara; y los yesos, que se distribuyen en la zona central y, sur de la Sierra de Almagro fundamentalmente, aunque su presencia está en todas las Unidades.

Los rasgos fundamentales que caracterizan la tectónica de la zona son: por un lado, la acumulación de diferentes materiales, producida por las sucesivas superposiciones de mantos de corrimiento; por otro, las grandes zonas de fracturas que delimitan las cuencas interiores y rompen la continuidad de las estructuras de los diferentes complejos tectónicos.



Mapa 2.1 Mapa geológico de la masa Sierra de Almagro (070.062)



1-1'

N.

S.



UNIDAD ALMAGRO-CUCHARON





T_{A31-A3} Calizas y dolomías

T_{A31} Yesos, brechas, meta-argilitas, pizarras, filitas, cuarcitas y calizas

$T_{A22-A31}$ Calizas, dolomías, pizarras y yesos

$P-T_{A22}$ Cuarcitas, pizarras, argilitas, calizas y yesos

ϵ^3 Metabasitas



SONDEO 254050094

0-30 m. Pliocuatenario. Conglomerados y areniscas.

30-149 m. Triásico. Calizas.

149-237 m. Triásico. Dolomías.

3.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS

Límites hidrogeológicos de la masa:

Límite	Tipo	Sentido del flujo	Naturaleza
Suroeste	Abierto	Condicionado	Divisoria entre los ámbitos de planificación del Segura y de la Cuenca Mediterránea Andaluza. El límite septentrional
Septentrional	Cerrado	Flujo nulo	Se establece por el contacto de las calizas, dolomías y mármoles del Triásico medio y superior con los materiales arcillosos y margosos pliocuaternarios
Este	Cerrado	Flujo nulo	El límite se define según el contacto de los afloramientos del Permico y Triásico, pertenecientes a esta masa, con materiales cuaternarios y margas tortonienses

Origen de la información de Límites hidrogeológicos de la masa:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 996, HUERCAL OVERA.
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 997, ÁGUILAS
IGME		2004	(IGME-Sociedad Geológica de España, 2004). GEOLOGÍA DE ESPAÑA.
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

Naturaleza del acuífero o acuíferos contenidos en la masa:

Denominación	Litología	Extensión del afloramiento km ²	Geometría	Observaciones
Sierra de Almagro	Carbonatos	6,4	Plegada	

Origen de la información de la naturaleza del acuífero:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 996, HUERCAL OVERA.
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 997, ÁGUILAS
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

Espesor del acuífero o acuíferos:

Acuífero	Espesor		
	Rango espesor (m)		% de la masa
	Valor menor en rango	Valor mayor en rango	
Sierra de Almagro	50	200	100

Origen de la información del espesor del acuífero o acuíferos:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 996, HUERCAL OVERA.
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 997, ÁGUILAS
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

Porosidad, permeabilidad (m/día) y transmisividad (m^2 /día)

Acuífero	Régimen hidráulico	Porosidad	Permeabilidad	Transmisividad (rango de valores)		Método de determinación
				Valor menor en rango	Valor mayor en rango	
Sierra de Almagro			Alta: 10+2 a 10-1 m/día			

Origen de la información de la porosidad, permeabilidad y transmisividad:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME			MAPA LITOESTRATIGRÁFICO DE ESPAÑA

Coefficiente de almacenamiento:

Acuífero	Coeficiente de almacenamiento			
	Rango de valores		Valor medio	Método de determinación
	Valor menor del rango	Valor mayor del rango		

Origen de la información del coeficiente de almacenamiento:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título

Información gráfica y adicional:

Mapa de permeabilidades según litología
 Mapa hidrogeológico con especificación de acuíferos


Descripción hidrogeológica

Comprende parte de la Sierra de Almagro, situada al O de la localidad de Los Guiraos, en la provincia de Almería.


La masa de Sierra de Almagro está formada por un solo acuífero constituido por calizas y dolomías del Triásico.

La masa queda limitada al SO por la divisoria entre los ámbitos de planificación del Segura y de la Cuenca Mediterránea Andaluza. El límite septentrional se establece por el contacto de las calizas, dolomías y mármoles del Triásico medio y superior con los materiales arcillosos y margosos pliocuaternarios. Al E el límite se define según el contacto de los afloramientos del Pérmico y Triásico, pertenecientes a esta masa, con materiales cuaternarios y margas tortonienses.

La recarga es mediante retornos de riego, recargas laterales e infiltración de las precipitaciones.



Mapa 3.1 Mapa de permeabilidades según litología de la masa Sierra de Almagro (070.062)



Mapa 3.2 Mapa hidrogeológico con especificación de acuíferos de la masa Sierra de Almagro (070.062)

4.- ZONA NO SATURADA

Litología:

Véase 2.- Características geológicas generales

Véase 3.- Características hidrogeológicas generales, en particular, mapa de permeabilidades, porosidad y permeabilidad

Espesor:

Fecha o periodo	Espesor (m)		
	Máximo	Medio	Mínimo
2008	280,00	167,00	113,00

Véase 5.- Piezometría

Suelos edáficos:

Tipo	Espesor medio (m)	% afloramiento en masa
ARIDISOL/CAMBID/HAPLOCAMBID/HAPLARGID/Torrifluent		22,11
ENTISOL/FLUVENT/TORRIFLUVENT/TORRIORTHENT		6,72
ENTISOL/ORTHENT/TORRIORTHENT/HAPLOCALCID		28,22
ENTISOL/ORTHENT/TORRIORTHENT/HAPLOCAMBID		0,10
ENTISOL/ORTHENT/TORRIORTHENT/TORRIFLUVENT		42,84

Vulnerabilidad a la contaminación:

Magnitud	Rango de la masa	% Superficie de la masa	Índice empleado

Origen de la información de zona no saturada:


Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGN		2001	MAPA DE SUELOS. ATLAS DE ESPAÑA

Información gráfica y adicional:

Mapa de Suelos

Mapa de espesor de la zona no saturada

Mapa de vulnerabilidad intrínseca




Mapa 4.1 Mapa de suelos de la masa Sierra de Almagro (070.062)

5. PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO.

5.1. UBICACIÓN DE PIEZÓMETROS

No existen piezómetros dispuestos sobre la masa de agua.



5.2. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA HISTÓRICA

Tal y como se concretó con anterioridad, no existen piezómetros sobre la masa de agua de referencia, así como tampoco sobre la porción del acuífero que excede los límites de la masa de agua.

6. SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS DEPENDIENTES

Demandas ambientales por mantenimiento de zonas húmedas:

Tipo	Nombre	Tipo vinculación	Código	Tipo de protección
No existen vinculaciones con sistemas de superficie				

Demandas ambientales por mantenimiento de caudales ecológicos:

Nombre Acuífero	Demanda mantenimiento caudales ecológicos (hm ³ /año)
No se han definido demandas ambientales en esta masa de agua para el mantenimiento del caudal ecológico	

Demandas ambientales por mantenimiento de interfaz salina:

Se considera necesario mantener una demanda medioambiental del 30% de los recursos en régimen natural en los acuíferos costeros. El establecimiento de esta demanda permite mantener estable la interfaz agua dulce/salada. Así, aunque se descarguen recursos continentales subterráneos al mar se protege al acuífero y a sus usuarios de la intrusión salina.

Nombre Acuífero	Demanda mantenimiento interfaz salina (hm ³ /año)
No se han definido demandas ambientales en esta masa de agua para el mantenimiento de la interfaz salina	

7. RECARGA.

Componente	Balance de masa Hm ³ /año	Periodo	Fuente de información
Infiltración de lluvia	0.2	Valor medio interanual	Balance de acuíferos del PHDS 2021/27
Retorno de riego	0		
Otras entradas desde otras demarcaciones	0.91 (Cuencas Mediterráneas Andaluzas)		
Salidas a otras demarcaciones	0)		

Observaciones sobre la Información de recarga:

Para la estimación de los recursos de cada acuífero y masa de agua subterránea se han adoptado las siguientes hipótesis de partida:

- I. La estimación del recurso disponible de cada acuífero de acuerdo con los valores recogidos en el Plan Hidrológico 2009/15, aprobado por Real Decreto Real Decreto 594/2014 de 11 de julio publicado en el BOE de 12 de julio de 2014. Estos balances han sido corregidos, para determinadas masas de agua subterránea, con los resultados de los últimos estudios desarrollados por la OPH en los últimos años.
- II. En el caso de las masas de agua con acuíferos compartidos con asignación de recursos del PHN vigente (Jumilla-Villena, Sierra de la Oliva, Salinas, Quíbas y Crevillente), se ha considerado el reparto de recursos que se definen en los trabajos que se enmarcan en el proyecto "Inventario de recursos hídricos subterráneos y caracterización de acuíferos compartidos entre demarcaciones hidrográficas", correspondiente a la 2ª Fase: Masas de agua subterránea compartidas. Encomienda de Gestión de la Dirección General del Agua (DGA) al Instituto Geológico y Minero de España (IGME). Año 2021.
- III. Se considera como recurso en las masas de agua que se corresponden con acuíferos no compartidos, las entradas por infiltración de lluvia y retornos de riego.
- IV. Se considera que la incorporación de otras entradas y salidas a las masas de agua (infiltración cauces, embalses, entradas marinas, laterales y subterráneas fundamentalmente de otras masas subterráneas) no debe considerarse en el cálculo del recurso disponible ya que se encuentran claramente afectados por los bombeos en los acuíferos y/o son transferencias internas entre acuíferos de la cuenca. Tan sólo en el caso de masas de agua que reciban entradas de agua subterránea procedente de otras cuencas se procederá a contabilizar a estas entradas como recurso de la masa de agua. De igual forma, en el caso de masas de agua que presenten salidas subterráneas a cuencas se procederá a contabilizar a estas salidas en el cálculo de los recursos de la masa de agua.
- V. En el caso de masas de agua identificadas con acuíferos compartidos sin asignación de recursos del PHN, el presente plan hidrológico propone la consideración de entradas/salidas subterráneas procedentes o con destino a otras cuencas para

tener en cuenta la existencia de un acuífero compartido que no responde a la divisoria de aguas superficiales.

- VI. Los valores calculados tienen como referencia el año hidrológico 2016/17 para los acuíferos compartidos del PHN vigente y 2017/18 para el resto de los acuíferos y se consideran válidos para evaluar el balance de las masas de agua representativas para la serie 1980/81-2017/18

8. RECARGA ARTIFICIAL

Esta masa de agua subterránea no contempla Recarga Artificial

9. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Extracciones	Hm ³ /año	Periodo	Fuente de información
Extracciones totales	1.11	Valor medio interanual	Balance de acuíferos PHDS 2021/27

Se consideran las extracciones sobre la masa de agua que están inventariadas en el Anejo 7 del presente Plan Hidrológico.

10. EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO

En la caracterización del estado químico de las masas de agua subterráneas o acuíferos se han tenido en cuenta las Normas de Calidad de las sustancias especificadas en el Anexo I de la Directiva de Aguas Subterráneas (DAS), integrada en el ordenamiento interno mediante el RD 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, y los Valores Umbral calculados para la lista de sustancias que figuran en el Anexo II.B:

- Sustancias, o iones, o indicadores, que pueden estar presentes de modo natural o como resultado de las actividades humanas: As, Cd, Pb, Hg, NH_4^+ ; Cl^- o SO_4^{2-} , nitritos y fosfatos.
- Sustancias sintéticas artificiales: tricloroetileno, tetracloroetileno.
- Parámetros indicativos de salinización o de otras intrusiones: conductividad, Cl^- o SO_4^{2-} .

Los criterios para la evaluación del estado químico de las aguas subterráneas son fundamentalmente dos:

- Normas de Calidad (NC): las especificadas en el Anexo I de la DAS: Nitratos y plaguicidas:
 - Nitratos 50 mg/l.
 - Plaguicidas 0,1 μl (plaguicidas individuales) o 0,5 (suma de plaguicidas).
- Valores Umbral (VU), para cuyo cálculo se necesitará obtener los Niveles de Referencia (niveles de fondo) y la elección del correspondiente Valor Criterio (VC), que por defecto será el valor límite establecido para las sustancias en el RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano.

Criterios específicos aplicados para el cálculo de niveles de referencia y valores umbral:

En el cálculo de niveles de referencia y umbrales de calidad en la cuenca del Segura se ha seguido las pautas definidas en la Guía para la Evaluación del Estado de las Aguas Superficiales y Subterráneas (MITERD, 2020), que tiene como objeto servir de referencia a los Organismos de cuenca para configurar los programas de seguimiento y evaluar los estados de las masas de aguas, sin perjuicio de la aplicación de los restantes criterios generales establecidos al respecto en la DMA, en la DAS y en la "Guidance N°18. Groundwater Status and Trend Assessment", cuya metodología se describe en el Apéndice Ib del Anexo I del Anejo 8.

Tipo de valor de referencia:

Para el cálculo de los valores de referencia, se ha utilizado el percentil 90:

- a. Como norma general se han considerado todos los datos históricos disponibles de análisis realizados sobre muestras procedentes de puntos de agua para el periodo entre 1964 y 2007 (Plan Hidrológico 2009/15).
- b. En las masas de agua subterránea con problemas de sobreexplotación se han tomado como referencia los muestreos realizados en los primeros años de la serie, si hay disponibilidad, coincidente con un estado piezométrico en equilibrio o próxima a él. El año último de la serie fijado para el establecimiento del NR dependerán de la evolución piezométrica de cada masa de agua subterránea.
- c. Se han tomado como referencia los datos procedentes de los puntos de control que

10.3. Valores Umbral (VU) indicativos de salinización o de otras intrusiones:

Cód.	Nombre	Umbral Parámetros		
		Cloruros (mg/l)	Sulfatos (mg/l)	Conductividad 20°C (µS/cm)
ES070MSBT000000062	Sierra Almagro			

10.4. RED DE CONTROL DE CALIDAD

La representatividad de los puntos de control sobre el acuífero y sobre la masa se establece de la siguiente manera:

- Para los puntos de control de un mismo acuífero que tienen incumplimientos de un determinado parámetro, se considerarán representativos de la totalidad del acuífero si los incumplimientos se dan en más de un 20% de los puntos de control en los que se han realizado analíticas del parámetro analizado.
- Se considerará un acuífero o grupo de acuíferos representativo de toda la masa de agua subterránea a la que pertenece cuando la superficie de los mismos dentro de la masa sea superior al 20% de la superficie total de la masa de agua subterránea.

La red de control de calidad está definida por los siguientes puntos de control:

COD Punto Control	Nombre	Acuífero	Geometría (X UTM -Y UTM)	Profundidad (m)
CA07000014	SAT. Los Guiraos	174	POINT (606087 4135708)	


10.5. EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTADO QUÍMICO POR NITRATOS (NC)

En la tabla siguiente se indican los puntos de control se presentan la concentración promedio para 2015-2019 en los puntos de control. Se sombrea en naranja las concentraciones superiores a 37,5 mg/l de nitratos y en rojo las concentraciones superiores a 50 mg/l que presentan incumplimiento de los OMA.

COD Punto Control	Promedio NO3 2015-2019 (mg/l)	Acuífero	Código Masa	Nombre Masa
CA07000014	0.21	174 Almagro	070.062	Sierra de Almagro

Código	Nombre	Acuífero	Nº Puntos Excede NC (50 mg/l NO3)	% Puntos Control afectados en acuífero	% del área de la MASub	Afección es >20% del área de la MASub
070.062	Sierra de Almagro	174 Almagro	0 de 1	0%	100%	No

No se aprecia mal estado químico en la masa de agua subterránea por incumplimientos en nitratos.



Evolución de la concentración de nitratos en la MASub

Respecto a la evolución de la concentración de nitratos en las aguas subterránea, no se aprecia una tendencia ascendente de la concentración de nitratos y se mantiene por debajo de límite de la inversión de tendencia de 37,5 mg/l.


10.6. EVALUACIÓN GENERAL DEL ESTADO QUÍMICO POR PLAGUICIDAS (NC)

No se detectan presencia de plaguicidas por encima de la norma de calidad para la suma total de plaguicidas ($>0,5 \mu\text{l}$) y para los plaguicidas de forma individual ($>0,1 \mu\text{l}$) en las muestras de aguas analizadas.

Código	Nombre	Acuífero	Nº Puntos Excede NC (0,1 $\mu\text{g/l}$ o Suma 0,5 μg)	% Puntos Control afectados en acuífero	% del área de la MASub	Afección es >20% del área de la MASub
070.062	Sierra de Almagro	174 Almagro	0 de 0	0%	100%	No

Del análisis de los datos anteriores puede establecerse un **BUEN ESTADO QUÍMICO por nitratos**.

Figura con puntos de control con incumplimientos (nitratos y plaguicidas)



10.7. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD POR PROCESOS DE SALINIZACIÓN U OTRAS INTRUSIONES (VU)

En esta MASub no se han definido Valores Umbral para cloruros, sulfatos y conductividad por riesgo químico asociado a procesos de intrusión.


10.8. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN ZONAS PROTEGIDAS POR CAPTACIÓN DE AGUAS DE CONSUMO (ZPAC)

Esta MASub no se ha catalogado como masa de aguas subterráneas con Uso Urbano Significativo al no presentar captaciones para abastecimiento.

Por estos motivos no se encuentra en el registro de Zonas Protegidas del Anejo 4 del PHDS 2021/27 y por tanto se han definido los Valores Umbral para los parámetros Anexo II.B del DAS.

11. USOS DEL SUELO Y CONTAMINACIÓN DIFUSA

Actividad	Método de cálculo	% de la masa
Pastos	Usos: Pasto arbustivo + Pasto con arbolado + Pastizal	75
Zona urbana	Usos: Zonas Urbanas + Edificaciones	0
Viales	Usos: Viales	1
Regadío	Superficie UDAs menos pastos, zona urbana y viales	1
Secano	Usos: superficie de suelo agrario menos la superficie de las UDAs	10
Otros usos	Resto de usos (entre ellos el forestal, corrientes y superficies de agua...)	13




12. FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL.

Fuentes significativas de contaminación	presiones inventariadas	presiones significativas
1.1 Vertidos urbanos		
1.2 Aliviaderos		
1.3 Plantas IED		
1.4 Plantas no IED		
1.5 Suelos contaminados / Zonas industriales abandonadas		
1.6 Zonas para eliminación de residuos		
1.7 Aguas de minería		
1.8 Acuicultura		
1.9 Otras (refrigeración)		
1.9 Otras (Filtraciones asociadas con almacenamiento de derivados de petróleo)		

Umbral de inventario y significancia adoptados para vertederos.

PRESIÓN	UMBRAL DE INVENTARIO	UMBRAL DE SIGNIFICANCIA
Vertederos controlados	Situados a sobre formaciones permeables del acuífero	Todos
Vertederos incontrolados	Todos	Todos los que contengan sustancias potencialmente peligrosas, y todos aquellos de estériles (por ejemplo, escombreras) cuando afecten a más de 500 m de longitud de masa de agua



LEYENDA

RED DE VIGILANCIA

- Cumplimiento NCA (50 mg/l NO₃)
- Incumplimiento NCA (>50 mg/l NO₃)

RED DE CONTROL NITRANET

- ▲ Cumplimiento NCA (50 mg/l NO₃)
- ▲ Incumplimiento NCA (>50 mg/l NO₃)
- Piezómetro de control y código

LEYENDA

- Límite de la DHS
- MSBT y código 070.0
- Acuífero y código
- Zonas Húmedas
- Zona Vulnerable y código
- Puntos de vertido autorizado
- Puntos de vertido no autorizado
- ✱ EESS (gasolineras)
- ✱ Vertederos

Fuente: PHDS 2021/2027 (Anejo 7)

13.-OTRA INFORMACIÓN GRÁFICA Y LEYENDAS DE MAPAS

ALFISOL	UDALF 1 HARPUDEF Dystroalf USTALF 2 HARPUSTALF Ustroalf 3 HARPUSTALF Ustroalf 4 HARPUSTALF Ustroalf																
	XEROLF 5 HARCOXEROLF Oxisol 6 HARCOXEROLF Rhodossol 7 HARCOXEROLF Rhodossol 8 HARCOXEROLF Rhodossol 9 HARCOXEROLF Rhodossol 10 HARCOXEROLF Rhodossol 11 HARCOXEROLF Rhodossol 12 HARCOXEROLF Rhodossol 13 HARCOXEROLF Rhodossol 14 HARCOXEROLF Rhodossol 15 HARCOXEROLF Rhodossol 16 HARCOXEROLF Rhodossol 17 HARCOXEROLF Rhodossol																
	18 HARCOXEROLF Rhodossol 19 HARCOXEROLF Rhodossol 20 HARCOXEROLF Rhodossol 21 HARCOXEROLF Rhodossol 22 HARCOXEROLF Rhodossol 23 PALDEXEROLF Oxisol 24 PALDEXEROLF Oxisol 25 RHODOXEROLF Rhodossol 26 RHODOXEROLF Rhodossol 27 RHODOXEROLF Rhodossol 28 RHODOXEROLF Rhodossol																
	29 TORRANDEF Torroalf 30 HARPUSTAND Ustroalf 31 HARPUSTAND Ustroalf 32 HARPUSTAND Ustroalf 33 USTVITRAND Ustroalf 34 USTVITRAND Ustroalf																
ANDISOL	35 PALARCID Haploarcid 36 HARLOCALCID Haploarcid 37 HARLOCALCID Haploarcid 38 HARLOCALCID Haploarcid 39 HARLOCALCID Haploarcid 40 HARLOCALCID Haploarcid 41 HARLOCALCID Haploarcid 42 HARLOCALCID Haploarcid 43 HARLOCALCID Haploarcid 44 HARLOCALCID Haploarcid																
	45 HARLOCALCID Haploarcid 46 HARLOCALCID Haploarcid 47 HARLOCALCID Haploarcid 48 HARLOCALCID Haploarcid 49 HARLOCALCID Haploarcid 50 HARLOCALCID Haploarcid 51 HARLOCALCID Haploarcid 52 HARLOCALCID Haploarcid 53 PETROLOCALCID Haploarcid																
ARIDISOL	54 HARLOCALCIB Haploarcid 55 HARLOCALCIB Haploarcid 56 HARLOCALCIB Haploarcid 57 HARLOCALCIB Haploarcid 58 HARLOCALCIB Haploarcid 59 CALCOXPSID Haploarcid 60 CALCOXPSID Haploarcid 61 HARLOCALCIB Haploarcid 62 ERAQUENT Haploarcid 63 ERAQUENT Haploarcid 64 ERAQUENT Haploarcid 65 SULFAQUENT Haploarcid 66 TORRELUENT Haploarcid 67 TORRELUENT Haploarcid 68 USTRELUENT Haploarcid 69 USTRELUENT Haploarcid																
	70 USTRELUENT Haploarcid 71 XEROFLEUENT Haploarcid 72 XEROFLEUENT Haploarcid 73 XEROFLEUENT Haploarcid 74 XEROFLEUENT Haploarcid 75 XEROFLEUENT Haploarcid 76 XEROFLEUENT Haploarcid 77 CRYORIENT Haploarcid 78 CRYORIENT Haploarcid 79 CRYORIENT Haploarcid 80 CRYORIENT Haploarcid 81 CRYORIENT Haploarcid 82 CRYORIENT Haploarcid																
	83 TORORIENT Haploarcid 84 TORORIENT Haploarcid 85 TORORIENT Haploarcid 86 TORORIENT Haploarcid 87 TORORIENT Haploarcid 88 TORORIENT Haploarcid 89 TORORIENT Haploarcid 90 TORORIENT Haploarcid 91 TORORIENT Haploarcid 92 TORORIENT Haploarcid 93 TORORIENT Haploarcid 94 TORORIENT Haploarcid 95 TORORIENT Haploarcid 96 TORORIENT Haploarcid 97 TORORIENT Haploarcid 98 USTORIENT Haploarcid 99 USTORIENT Haploarcid 100 USTORIENT Haploarcid 101 USTORIENT Haploarcid 102 USTORIENT Haploarcid 103 USTORIENT Haploarcid																
	104 USTORIENT Haploarcid 105 USTORIENT Haploarcid 106 USTORIENT Haploarcid 107 USTORIENT Haploarcid 108 USTORIENT Haploarcid 109 USTORIENT Haploarcid 110 USTORIENT Haploarcid 111 USTORIENT Haploarcid 112 USTORIENT Haploarcid 113 USTORIENT Haploarcid 114 XERORIENT Haploarcid 115 XERORIENT Haploarcid 116 XERORIENT Haploarcid 117 XERORIENT Haploarcid 118 XERORIENT Haploarcid 119 XERORIENT Haploarcid 120 XERORIENT Haploarcid 121 XERORIENT Haploarcid 122 XERORIENT Haploarcid 123 XERORIENT Haploarcid 124 XERORIENT Haploarcid 125 XERORIENT Haploarcid																
ENTISOL	126 XERORIENT Haploarcid 127 XERORIENT Haploarcid 128 XERORIENT Haploarcid 129 XERORIENT Haploarcid 130 XERORIENT Haploarcid 131 XERORIENT Haploarcid 132 XERORIENT Haploarcid 133 XERORIENT Haploarcid 134 XERORIENT Haploarcid 135 XERORIENT Haploarcid 136 XERORIENT Haploarcid 137 XERORIENT Haploarcid 138 XERORIENT Haploarcid 139 XERORIENT Haploarcid 140 XERORIENT Haploarcid 141 XERORIENT Haploarcid 142 XERORIENT Haploarcid 143 XERORIENT Haploarcid 144 XERORIENT Haploarcid 145 XERORIENT Haploarcid																
	146 HISTOSOL HISTOSOL 147 AQUEPT Haploarcid 148 CRYEPT Haploarcid 149 CRYEPT Haploarcid 150 CRYEPT Haploarcid 151 CRYEPT Haploarcid 152 EUTROCRYPT Haploarcid 153 EUTROCRYPT Haploarcid 154 UDEPT Haploarcid 155 UDEPT Haploarcid 156 UDEPT Haploarcid 157 DISTROUPT Haploarcid 158 DISTROUPT Haploarcid 159 DISTROUPT Haploarcid 160 DISTROUPT Haploarcid 161 DISTROUPT Haploarcid 162 EUTROUPT Haploarcid 163 EUTROUPT Haploarcid 164 EUTROUPT Haploarcid 165 DISTROUPT Haploarcid 166 DISTROUPT Haploarcid 167 DISTROUPT Haploarcid																
	168 HARPUSTERT Haploarcid 169 HARPUSTERT Haploarcid 170 HARPUSTERT Haploarcid 171 HARPUSTERT Haploarcid 172 HARPUSTERT Haploarcid 173 HARPUSTERT Haploarcid 174 HARPUSTERT Haploarcid 175 HARPUSTERT Haploarcid 176 HARPUSTERT Haploarcid 177 HARPUSTERT Haploarcid 178 HARPUSTERT Haploarcid 179 HARPUSTERT Haploarcid 180 CALCIERPT Haploarcid 181 CALCIERPT Haploarcid 182 CALCIERPT Haploarcid 183 CALCIERPT Haploarcid 184 CALCIERPT Haploarcid 185 CALCIERPT Haploarcid 186 CALCIERPT Haploarcid 187 CALCIERPT Haploarcid 188 CALCIERPT Haploarcid 189 CALCIERPT Haploarcid 190 CALCIERPT Haploarcid 191 CALCIERPT Haploarcid 192 CALCIERPT Haploarcid																
	193 CALCIERPT Haploarcid 194 CALCIERPT Haploarcid 195 CALCIERPT Haploarcid 196 CALCIERPT Haploarcid 197 CALCIERPT Haploarcid 198 CALCIERPT Haploarcid 199 CALCIERPT Haploarcid 200 CALCIERPT Haploarcid 201 CALCIERPT Haploarcid 202 CALCIERPT Haploarcid 203 DISTROUPT Haploarcid 204 DISTROUPT Haploarcid 205 HARPUSTERT Haploarcid 206 HARPUSTERT Haploarcid 207 HARPUSTERT Haploarcid 208 HARPUSTERT Haploarcid 209 HARPUSTERT Haploarcid 210 HARPUSTERT Haploarcid 211 HARPUSTERT Haploarcid 212 HARPUSTERT Haploarcid 213 HARPUSTERT Haploarcid																
MOLLISOL	214 UDOLL Haploarcid 215 HARPUOLL Haploarcid 216 HARPUOLL Haploarcid 217 HARPUOLL Haploarcid 218 XEROLL Haploarcid 219 HARPUOLL Haploarcid 220 HARPUOLL Haploarcid 221 HARPUOLL Haploarcid 222 HARPUOLL Haploarcid 223 ORTHOD Haploarcid 224 USTULT Haploarcid 225 XERULT Haploarcid 226 XERULT Haploarcid																
	227 UDERT Haploarcid 228 USTERT Haploarcid 229 HARPUERT Haploarcid 230 HARPUERT Haploarcid 231 HARPUERT Haploarcid 232 HARPUERT Haploarcid 233 HARPUERT Haploarcid 234 HARPUERT Haploarcid 235 HARPUERT Haploarcid																

IDENTIFICACIÓN DE SUELOS

Unidad cartográfica

SUBORDEN	código
GRUPO 1	
GRUPO 2	
ASOCIACIÓN 1	
ASOCIACIÓN 2	
Inclusión 1	
Inclusión 2	

La unidad taxonómica de suelo (versión del año 2003 de Soil Taxonomy) constituye el contenido de la unidad cartográfica y está formada por uno o dos suelos principales (40-60 %), uno o dos suelos asociados (15-40 %) y uno o dos inclusiones (<15 %).

La leyenda se ha ordenado de acuerdo con la taxonomía de los suelos principales, asociados e inclusiones en ese orden.

El suelo principal (grupo 1 a grupo 1 + grupo 2) proporciona el color a cada conjunto de unidades cartográficas que aparecen juntas en la leyenda.

Sólo se ha indicado el nombre del suborden en el primer conjunto de unidades cartográficas. En el resto sólo aparecen, si procede, los nombres del grupo, asociación e inclusiones para cada unidad cartográfica.

Consulta ejemplo: suelo con código 91 { orden: Entisol suborden: Orthod grupo 1: Torroalf asociación 1: Haploarcid inclusión 1: Haploarcid

