MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Caracterización adicional de las masas de agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015

Demarcación Hidrográfica del Segura

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA

070.002 Sinclinal de la Higuera

ÍNDICE:

La presente ficha de caracterización está compuesta por 16 apartados, de los cuales 9 están desarrollados por el IGME y 7 por la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS.

1.-IDENTIFICACIÓN (IGME)
2.-CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS (IGME)
3.-CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS (IGME)
4.-ZONA NO SATURADA (IGME)
5.-PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DE ALMACENAMIENTO (IGME)
6.-SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS DEPENDIENTES (OPH)
7.-RECARGA (OPH)
8.-RECARGA ARTIFICIAL (OPH)
9.-EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS (OPH)
10.-CALIDAD QUÍMICA DE REFERENCIA (OPH)
11.-EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO (OPH)
12.-DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS DE CONTAMINANTES (OPH)
13.-USOS DEL SUELO (IGME)
14.-FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN (IGME)
15.-OTRAS PRESIONES (IGME)
16.-OTRA INFORMACIÓN GRÁFICA Y LEYENDAS DE MAPAS (IGME)

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (nombre y código): **Sinclinal de la Higuera 070.002**

1.- IDENTIFICACIÓN

Clase de riesgo Cuantitativo **Detalle del riesgo** Cuantitativo extracción

Ámbito Administrativo:

Demarcación hidrográfica	Extensión (km 2)
SEGURA	297,50

CC.AA.	Provincia/s
Castilla-La Mancha	02-Albacete

Población asentada:

Tipo de población	Nº de habitantes en el entorno de la masa	Censo (año)
De derecho (censada)	1.270	2007
De hecho (estimada)	1.291	2005


Topografía:

Distribución de altitudes	
Altitud (m.s.n.m)	
Máxima	1.040
Mínima	790


Modelo digital de elevaciones		
Rango considerado (m.s.n.m)		Superficie de la masa (%)
Valor menor del rango	Valor mayor del rango	
790	850	15
850	890	35
890	930	41
930	1.040	9

Información gráfica:

Base cartográfica con delimitación de la masa
Mapa digital de elevaciones



Mapa 1.1 Mapa base cartográfica de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)



Mapa 1.2 Mapa digital de elevaciones de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)

2.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS

Ámbito geoestructural:

Unidades geológicas
Prebético
Sinclinal de La Higuera

Columna litológica tipo:

Litología	Extensión Afloramiento km2	Rango de espesor (m)		Edad geológica	Observaciones
		Valor menor del rango	Valor mayor del rango		
Arcillas y yesos		100		Keuper	
Calizas, dolomías y margas	70,10	375	495	Jurásico	
Arcillas y arenas	70,90	50	110	Cretácico Weald	
Conglomerados, areniscas y arcillas	48,40	40	55	Terciario	
Arenas y limos	19,10	0	90	Cuaternario	

Origen de la información geológica:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 818, MONTEALEGRE DEL CASTILLO.
IGME		2004	(IGME-Sociedad Geológica de España, 2004). GEOLOGÍA DE ESPAÑA.
IGME	62556	2002	LANDETE


Información gráfica:

Mapa geológico
Cortes geológicos y ubicación
Columnas de sondeos
Descripción geológica en texto


Descripción geológica


Los materiales que se encuentran en la unidad de muro a techo son los siguientes: materiales de edad triásica, (arcillas y yesos del Keuper), sobre estos hay un conjunto de materiales de edad jurásica (calizas, dolomías, margas). Por encima se encuentran materiales cretácicos (arcillas y arenas –facies Weald-) y finalmente existen depósitos carbonatados cretácicos y depósitos terciarios y cuaternarios formado por materiales permeables de mucha menor importancia.


La disposición estructural está condicionada por un conjunto de fracturas subverticales de orientación SO-NE que separan bloques levantados y hundidos, dentro de los que existe una estructura sinclinal (la más importante).



Mapa 2.1 Mapa geológico de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)


NO.
1
1´
SE
Casas de Pascual
1000
900
800
700 m.


NO.
2
Cra. Corral Rubio
-La Higuera
Cra. Corral Rubio
-La Higuera
La Higuera
2´
SE.



36 Q_3C Depósitos de pie de talud y coluvial. Arcillas con cantos angulosos localmente encostrados.

35 Q_2Cd Conos de deyección. Conglomerados, arenas y arcillas encostrados superficialmente.

34 Q_2Ma Mantos de arroyada difusa. Arenas, limos y arcillas encostrados.

33 $Q_{1-2}G$ Glacis de acumulación. Niveles de arcillas y cantos con costras discontinuas.

32 $T^{a}_{b2}Q_1$ Conglomerados y areniscas rojas.

31 $T^{a}_{b2}Q_1$ Arcillas rojas. Localmente calizas.

30 T^{a}_{b2} Conglomerados calcáreos.

29 T^{Bb-Ba}_{12-11} Margas blancas, areniscas y conglomerados.

28 T^{Bb-Ba}_{12-11} Biocalcarenitas

27 $T^{Ba}_{10,1}$ Conglomerados, areniscas y arcillas naranjas ocasionalmente con algún nivel de calizas.

26 C_{23-26} Calizas con "Lacazinas".

25 C_{21-22} Alternancia de dolomías y limos dolomíticos.

24 C_{21} Dolomías y margas verdes.

23 C_{19} Arenas y arcillas versicolores.

22 C_{W16-18} Arenas, arcillas y dolomías.

21 C_{16} Calizas beige con Orbitolinas y biocalcarenitas con intercalaciones arenosas.

20 C_{9-16} Arenas, arcillas y microconglomerados.

19 C_{15} Calizas y dolomías con "Toucasias".


18 C_{W14}-C^{1}_{15} Arcillas, margas rojas y verdes con niveles de areniscas y conglomerados.

17 J^{3}_{32} Arcillas, areniscas micáceas y calizas.

SONDEO Nº 818/192 "LA HIGUERA" (4)

325550 04

EDAD	FORMAC.ª	DESCRIPCION LITOLOGICA	LITOLOGIA	PROF (m)	TUBERIA	OBSERVACIONES
KIMME. OXF.	LOREN.	0-28,5 m. margas grises con alguna parada de margocaliza 28,5-35,5 m. caliza nodulosa				
DOGGER CHOPRO		35,5-331,5 m. Dolomia gris granuda con grandes romboedros con frecuencia deleznables				



ESCALA 1:2.500

OBJETIVOS

Estimación del espesor de la Formación Chorro
Investigación de su comportamiento hidráulico
Verificación del nivel piezométrico

RESULTADOS

Quedan expuestos el espesor y caracteristicas hidráulicas.
En cuanto al nivel piezométrico este sondeo nos indicó que la estructura del sinclinal de La Higuera poseia un nivel distinto al de la unidad Tobarra-Albacete

PERFORACION

Perforado de 0-75 m. con trepano de 560 m.m Ø.
75-300 m. con trepano de 450 m.m Ø
300-331,5 m. trepano de 350 m.m Ø

TUBERIA

0-67 m. tuberia de 500 m.m Ø
67-147 m. tuberia de 450 m.m Ø
147-299 m. tuberia de 400 m.m Ø
299-331,5 m. tuberia de 350 m.m Ø

DIAGRAFIAS

Rayos Gamma
Pref: 168 m

TESTIGOS MECANICOS

Se intentó sacar un testigo en maquina acoplada a sonda de percusión, sin resultado positivo

OPERACIONES ESPECIALES

Se instaló 20 m al E. un piezometro de 104 m. de profundidad.
Perforación: 0-24 m. tricono de Ø 160 m.m Aire
24-104 m. tricono de Ø 110 m.m. Lodo
Entubación: 55 m. con tuberia de Ø 80 m.m

PIEZOMETRO AUXILIAR

Se ha instalado un piezometro de 102 m.
Entubado de 0-55 m. con tuberia de 80 m.m


NIVEL PIEZOMETRICO

Profundidad: 75 m.
Cota absoluta: 764,42

DATOS

Coordenadas
X = 2º 18' 02" 799.700
Y = 38º 47' 55" 467.500
Z = 839,42
Hoja.. 818
Término - MONTEALEGRE
Paraje - EL ESTRECHO

SITUACION DEL SONDEO



FOTOGRAMAS 5757-5758-R-70

PRUEBA DE BOMBEO

Bomba - INDAR KM-150
Tipo - SUMERGIDA
Profundidad - 96 MTS

SONDEO

Caudal	55 l/s	
Tiempo	24 h	
Descenso	1,74 m	
Recuperación	T: 426	$S = 4 \times 10^{-2}$

PIEZOMETROS

Distancia	Descenso
15 m.	0,87 m.

ANALISIS QUIMICO

PERFORACION

Metodo - PERCUSION
Sonda -
Empezó - 17-3-71
Termino - 6-11-71
Ejecución - RODES
Nº de jornadas - 165
Profundidad - 331,5 MTS
Propietario finca -

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
PARQUE MAQUINARIA AGRICOLA


Nº P.M.A. 2109
SONDA: 2-2-2 y 2-2-1
INICIACION: 28-I-72
TERMINACION: 11-VII-72

Sondeo: "VILLACAÑAS"
Término municipal: FUENTE ALAMO (ALBACETE)
Propietario: Hoja/octante 818/5
Longitud: 02°12'23"E Latitud: 38°44'10" Altitud: 861 ±2
Nombre de la finca:
Nombre del propietario: 263250028
Marcado por:

Madrid de 19
El Ingeniero Agrónomo

Control geológico

PI-Q = PLIO-CUATERNARIO; - M = MIOCENO; - N = EOCENO-OLIGOCENO (TOBARRILLAS); - C_{T-2} = CENOMANIENSE-TURONENSE (QUESADA-FRANCO); - G_W = APTENSE-ALBIENSE (F. UTRILLAS); - J_{S-6} = MALM MEDIO-SUP. (KIMMERIDGIENSE (LORENTE); - J_3 = DOGGER (CHORRO); - J_{1-2} = LIAS MEDIO SUP. (MONTAÑO-COLLADO).-



ESCALA 1:50.000

CONGLOMERADO
BRECHA
ARENA
ARENISCA
ARENISCA CALCAREA
ARENISCA CUARCITICA
ARENISCA ARCILLOSA
LIMOLITA
ARCILLA
PIZARRA
ARCILLA ARENOSA
PIZARRA CARBONOSA
ARCILLA MARGOSA
MARGA
CALIZA
CALIZA ARCILLOSA

CALIZA ARENOSA
CALCILUTITA
CALCARENITA
CALCIRUDITA
CALIZA OOLITICA-PISOLITICA
PSEUDO BRECHA
CALIZA ARRECIFAL
MODULOS DE SILEX
DOLOMIA
CALIZA DOLOMITICA
YESO Y ANHIDRITA
SAL
ROCAS PLUTONICAS
ROCAS EFUSIVAS
ROCAS METAMÓRFICAS

PIRITA
HALITA
GLAUCONITA
FELDESPATOS
MOSCOVITA
BIOTITA
CARBON
FOSFATO
CONCRECIONES FERRUGINOSAS
SIDERITA
MICROFOSILE EN GENERAL
MACROFAUNA EN GENERAL
RESTOS DE PLANTAS

ACUIFERO
ACUIFUGO


Completado

ENTUBA CON UNA COLUMNA COMBINADA DE 4½"Φ - 6⅝" - 7" Y 5½"Φ TOTAL 108,37m. DESARROLLO CON COMPRESOR: (5 JORNADAS). Q= ½ L/s. - TRATAMIENTO CON T.N.T. (100 kgs) NO SE TOMA MUESTRAS Y CON ARRASTRE.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACION
PARQUE MAQUINARIA AGRICOLA

PERFIL LITOLOGICO

Sondeo "VILLACAÑAS"
Tº Municipal FUENTE ALAMO (ALBACETE)
Hoja /octante 818 /5 Nº P.M.A. 2109
Coordenadas 02°12'23"E - 38°44'10"
Altitud 861 ±2
El Ingeniero Agrónomo


Prof. y diám.
Entub. Perf.
12¼"
17½"
5½"
20¼"
34,67
7"
44,34
17½"
47,66
14,83
31,36
12¼"
65,½"
RAJADA
91,05
4½"
97,50
8¾"
108,37
OXFORDIENSE
DOGGER
209-1
209-18
209-35
209-55
209-65
209-34
209-55
209-43
Caliza (muesta en zonas esparitica a veces algo calitica y pisolitica con algunos restos de algas, fragmentada, con recristalizaciones de calcita).
Colores beige a beige-amarillento ale a beige-verdoso y rosa (rara vez zonas amarillentas, ambiguas) porosidad intima escasa matriz blanca intersticial en el primer metro y del m. 18 a 22.-
Caliza (muesta en zonas esparitica), color beige-amarillento a beige-amarillento con oquedades matriz blanca intersticial, fracturada y con algunas fisuras de algas. En ocasiones escasos restos recristalizados (esparita) de crinoides y algas y, más frecuentemente, solo se aprecian restos de calcita.
Bajo esta totalmente recristalizada esparitica de marcado aspecto sacaroide constituida por cristales de hasta 5 mm. de calcita. Contiene regiones con moldes (restos de algas (esparita) hasta el m. 38. Se encuentra fracturada y con finos arcilla blanca intersticial, con granos de dolomia intercalados en ella entre los metros 34 al 36 y 38 al 67.- Tonalidades: beige a beige-grisaceo (color normal), pasando a beige-amarillento rosaceo y amarillo en las rajolas y marga. En algunas de las zonas de fractura se aprecian restos de calcita recristalizada. Las propiedades de dolomia y dolomitica son variables, en algunos casos debido a la abundancia de restos de algas (esparita) y dolomitica y dolomia sobre todo, hasta el m. 40 aproximadamente).
Marga beige con algunos intervalos con dolomitica en el segmento inferior.
Dolomia o dolomia-caliza algunas regiones de caliza dolomitica (probablemente desde el m. 95 hasta el fondo la caliza dolomitica), recristalizada, en grano medio a muy grueso con zonas de intercalados de oolitas, pisolitos y de restos fosiles (crinoides), fracturada y esporadicamente beige grisaceo a gris y beige amarillento, oqui regiones impermeables (o veces cavernosidades) y rocosas.
A veces se observa la presencia, quizás en zonas superiores y fracturas, de polvo de dolomia blanco o blanco beige (muestra 72 al 76; 81 al 86; 100 al 104) a veces incluidos en marga en poco arrosarios (m. 104 al 105 y, m. 80 al 81, en donde old fundidad amarillo verdosa).

Observaciones
NL
m.
DUDAS
① CONTINUA CON 17½" ② ENSANCHE A 20¼".
① CONTINUA CON 14"Φ ② ES PESCA LA HILERA Y CONTINUA PERFORANDO CON 17½"
VISITA GEOLOGO. ① SE ESCARIA LA HILERA: ENSANCHE A 17½" CONTINUA EL 20 DE AGOSTO LA PERFORACION
VISITA GEOLOGO
VISITA GEOLOGO.
VISITA GEOLOGO.

3.- CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS

Límites hidrogeológicos de la masa:

Límite	Tipo	Sentido del flujo	Naturaleza
Norte	Abierto	Condicionado	Divisoria de aguas
Sur	Abierto	Salida	Interconexión
Este	Cerrado	Flujo nulo	Impermeable
Oeste	Cerrado	Flujo nulo	Impermeable

Origen de la información de Límites hidrogeológicos de la masa:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 818, MONTEALEGRE DEL CASTILLO.
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS
CHS	51	2006	ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN ANUAL DE SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 07.02 SINCLINAL DE LA HIGUERA, 07.03 BOQUERÓN, 07.16 TOBARRA-TEDERA-PINILLA, 07.18 PINO, 07.49 CONEJEROS-ALBATANA, 07.55 CORRAL-RUBIO. CONFEDE
MMA		2007	ESTUDIO GENERAL SOBRE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Naturaleza del acuífero o acuíferos contenidos en la masa:

Denominación	Litología	Extensión del afloramiento km^2	Geometría	Observaciones
Sinclinal de la Higuera	Carbonatado	114,0	Sinclinal	

Origen de la información de la naturaleza del acuífero:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS

Espesor del acuífero o acuíferos:

Acuífero	Espesor		
	Rango espesor (m)		% de la masa
	Valor menor en rango	Valor mayor en rango	
Sinclinal de la Higuera	200	300	100

Origen de la información del espesor del acuífero o acuíferos:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1972	MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA. MAGNA HOJA 818, MONTEALEGRE DEL CASTILLO.
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS
CHS	51	2006	ESTUDIO DE CUANTIFICACIÓN DEL VOLUMEN ANUAL DE SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE LAS UNIDADES HIDROGEOLÓGICAS 07.02 SINCLINAL DE LA HIGUERA, 07.03 BOQUERÓN, 07.16 TOBARRA-TEDERA-PINILLA, 07.18 PINO, 07.49 CONEJEROS-ALBATANA, 07.55 CORRAL-RUBIO. CONFEDE

Porosidad, permeabilidad (m/día) y transmisividad (m^2/día)

Acuífero	Régimen hidráulico	Porosidad	Permeabilidad	Transmisividad (rango de valores)		Método de determinación
				Valor menor en rango	Valor mayor en rango	
Sinclinal de la Higuera	Confinado	0,03	Media: 10-1 a 10-4 m/dia	426,0	6.000,0	Información PIAS
Sinclinal de la Higuera	Confinado			130,0	242,0	CHS

Origen de la información de la porosidad, permeabilidad y transmisividad:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1973	PIAS PROYECTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA CUENCA BAJA DEL SEGURA
MMA	46	2005	ESTUDIO INICIAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEA DE LAS CUENCAS INTERCOMUNITARIAS
CHS		2001	INFORME HIDROGEOLÓGICO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL T.M. DE FUENTE ALAMO

Coeficiente de almacenamiento:

Acuífero	Coeficiente de almacenamiento			
	Rango de valores		Valor medio	Método de determinación
	Valor menor del rango	Valor mayor del rango		
Sinclinal de la Higuera			0,00010	Ensayo de Bombeo

Origen de la información del coeficiente de almacenamiento:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
CHS		2001	INFORME HIDROGEOLÓGICO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN EL T.M. DE FUENTE ALAMO

Información gráfica y adicional:

Mapa de permeabilidades según litología
Mapa hidrogeogógico con especificación de acuíferos

Descripción hidrogeológica

Se distinguen 3 acuíferos dentro de la unidad, cuyos funcionamientos son sensiblemente diferentes (de muro a techo):

- El acuífero principal esta formado por calizas y dolomías del jurásico (SHJ), con un espesor aproximado de 400 metros (entre 375 y 495 metros). El muro impermeable lo constituyen las arcillas y yesos de edad triásica, si bien localmente podrían constituirlo materiales liásicos (Jurásico) con importantes componentes arcillosos. Se trata del acuífero más importante de la unidad.

- Por encima de este acuífero jurásico se halla un importante conjunto de materiales arcillosos y margosos con intercalaciones de lechos de areniscas y conglomerados (Facies Weald de edad Barremiense, Cretácico inferior). Estos materiales son de baja permeabilidad y confinan al acuífero jurásico y lo aíslan de un acuífero superior (SHC)

- Por último, se detectan niveles freáticos en materiales cuaternarios y terciarios (SHTC), materiales en general poco consolidados. Estos materiales no presentan grandes espesores, aunque si importante extensión superficial y el agua almacenada en ellos es captada por numerosos pozos poco profundos.

Además, se ha detectado un sector anómalo en la zona de las Anorias (límite con la Unidad Hidrogeológica Tobarra-Tedera-Pinilla) que será objeto de un análisis específico posterior.

El funcionamiento, que se ha observado en todo el acuífero, denota una buena comunicación y respuesta, o lo que es lo mismo, una transmisividad elevada.

Del estudio del funcionamiento de la unidad y sus relaciones con los acuíferos contiguos, se ha deducido que:


- Al Oeste el límite con la Unidad de Corral Rubio existe una gran fractura.

- Por el Sur existe una importante desconexión debido a la existencia de una estructura plegada y fracturada que eleva el impermeable de base (Montealegre del Castillo).


- En el límite con la Unidad de Tobarra-Tedera-Pinilla por el Suroeste y en el Norte con la cuenca del Júcar existen incertidumbres.

- La piezometría del sector de Pinilla (UH Tobarra-Tedera-Pinilla) muestra una continuidad perfecta con la del Sinclinal de la Higuera. En el sector norte del Júcar también parece mostrar continuidad en la piezometría, aunque es de menor entidad que la que se detecta en Pinilla.

La principal conexión, por lo tanto, es la que se produce con la Unidad de Tobarra-Tedera-Pinilla, ya que de forma generalizada y desde el sector de Bonete todos los niveles piezométricos indican un flujo en esa dirección, aunque con un gradiente muy bajo.



Mapa 3.1 Mapa de permeabilidades según litología de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)



Mapa 3.2 Mapa hidrogeológico con especificación de acuíferos de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)

4.- ZONA NO SATURADA

Litología:

Véase 2.- Características geológicas generales
Véase 3.- Características hidrogeológicas generales, en particular, mapa de permeabilidades, porosidad y permeabilidad

Espesor:

Fecha o periodo	Espesor (m)		
	Máximo	Medio	Mínimo
1985-2000	137,00	103,00	72,00
2000-2007	154,00	127,00	81,00

Véase 5.- Piezometría

Suelos edáficos:

Tipo	Espesor medio (m)	% afloramiento en masa
ARIDISOL/CALCID/HAPLOCALCID/CALCIGYSIP/HALOSALID/Haplogysid		5,62
ARIDISOL/CALCID/HAPLOCALCID/HAPLARGID		11,43
ARIDISOL/CALCID/HAPLOCALCID/HAPLARGID/Haplosalid/Torriorthent		1,74
ARIDISOL/CALCID/HAPLOCALCID/TORRIORTHENT/Haplargid		62,16
ARIDISOL/CALCID/HAPLOCALCID/TORRIORTHENT/Haplargid		0,01
ENTISOL/ORTHENT/TORRIORTHENT/HAPLOCALCID/Haplargid/Petrocalcid		19,04

Vulnerabilidad a la contaminación:


Magnitud	Rango de la masa	% Superficie de la masa	Índice empleado

Origen de la información de zona no saturada:


Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGN		2001	MAPA DE SUELOS. ATLAS DE ESPAÑA

Información gráfica y adicional:

Mapa de Suelos
Mapa de espesor de la zona no saturada
Mapa de vulnerabilidad intrínseca



Mapa 4.1 Mapa de suelos de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)



Mapa 4.2 Mapa de espesores máximos de la zona no saturada de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)

5.- PIEZOMETRÍA. VARIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO

Red de seguimiento:

Nº Puntos:	Densidad Espacial (por 100 km^2):	Periodo:
2	0,67	1985-2008

Frecuencia de medidas:	Organismo que opera la red:
Bimestral	CHS

Origen de la información: REPORTING DE MARZO DE 2007 PARA CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 8 DE LA DMA

Análisis de tendencias: Descenso en niveles..

Evolución del llenado: Descenso del índice de llenado..

Características piezométricas:

Isopiezas	Año	Nº Puntos	Nivel piezométrico (m.s.n.m)		Diferencia (max-min) (m)	Rango de oscilación estacional (m)	Sentido de flujo	Gradiente (1)
			Max.	Min.				
De referencia	1985	2	764,79	760,60	4,19	2,55	NE a SO	0,16%
Recientes estiaje	2007	2	722,64	721,77	0,87			
Recientes periodo húmedo	2007	2	724,78	722,79	1,99			
De año seco	1995	2	764,17	742,94	21,23	2,69		
De año húmedo	1989	2	755,19	751,67	3,52	1,93		

(1) Gradiente medio en el sentido del flujo principal

Orígen de la información RED DE SEGUIMIENTO PIEZOMÉTRICO CHS

Observaciones:

Estado/variación del almacenamiento:

Acuífero	Evolución


Origen información: BB.DD de piezometría DGA-MMA (2007) según metodología de Informes de coyuntura anuales del MMA (en http://www.mma.es/portal/secciones/info_estadistica_ambiental/estadisticas_info/informes_coyuntura/informe_anual/index.jsp)

Origen de la información de piezometría:


Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título

Información gráfica y adicional:


Gráficas de evolución piezométrica
Mapas piezométricos o de isopiezas (referencia, actual, año húmedo, seco, etc.)
Otros mapas de isopiezas
Gráficas de evolución del índice de llenado




Mapa 5.1 Mapa de situación de piezómetros utilizados para la gráfica de evolución e índice de llenado de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)




Mapa 5.2.a Mapa de puntos de información del nivel medio de agua del año de referencia (1981-1982) de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)



Mapa 5.2.b Mapa de puntos de información del nivel medio de agua del año actual (2008) de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)




Mapa 5.2.c Mapa de puntos de información del nivel medio de agua del año húmedo (1995-1996) de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)





Mapa 5.2.d Mapa de puntos de información del nivel medio de agua del año seco (1993-1994) de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)



710
711
680
670
660
711
670
665
660
Fecio
Jumilla
Pinoso
Caudete



Isopiezas del acuífero jurásico (año 2006)


Nivel Piezométrico 07.02.001
m
770
765
760
755
750
745
740
735
730
725
720
02/1982
08/1987
01/1993
07/1998
01/2004
07/2009


Nivel Piezométrico 07.02.002
770
760
750
E 740
730
720
710
02/1982
11/1984
08/1987
05/1990
01/1993
10/1995
07/1998
04/2001
01/2004
10/2006
07/2009


070.002
100
80
60
40
20
0
%
nov
dic
ene
feb
mar
abr
may
jun
jul
ago
sep
oct
PERIODO 2004-2007

6. SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS DEPENDIENTES

Zonas húmedas:

Tipo	Nombre	Tipo vinculación	Código	Tipo de protección
Lagunas	Laguna de Atalaya de los Ojitos	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna de Casa Nueva 1	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna de Casa Nueva 2	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna del Saladar de la Higuera	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna de Hoya Rasa	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna del Mojón Blanco 1	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna del Mojón Blanco 2	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna del Mojón Blanco 3	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA
Lagunas	Laguna de la Higuera	Descarga directa	ES4210004	LIC
			ES0000153	ZEPA

NOTA: Vinculación por descarga parcial vertical: La zona húmeda se encuentra vinculada al sector Cretácico, y no al Jurásico, el cual es objeto de explotación. Pero no existe información suficiente para desechar la interconexión entre ambos sectores.

Observaciones sobre el tipo de vinculación:

Se ha diferenciado en tres tipos de vinculación por descarga directa de recursos subterráneos:

- Vinculación total por descarga: indica que el humedal depende para su conservación, total o parcialmente, de la descarga de recursos subterráneos de la masa de agua subterránea.
- Vinculación parcial vertical por descarga: La zona húmeda depende para su conservación, total o parcialmente, de la descarga de recursos subterráneos de alguno de los sectores diferenciados de la masa de agua subterránea. Es el caso del Sinclinal de la Higuera donde los humedales se encuentran relacionados con el sector Cretácico, y no al Jurásico, el cual es objeto de explotación para regadío. Es el nivel piezométrico del sector Cretácico el que debe conservarse y no presentar descensos que impliquen una merma de recursos a los ecosistemas ligados. Así, el buen estado de la masa de agua subterránea dependerá de la no sobreexplotación de sus recursos y del mantenimiento de los niveles del acuífero Cretácico. No existe información suficiente para desechar totalmente la interconexión entre ambos sectores.
- Vinculación parcial areal por descarga: la zona húmeda depende para su conservación, total o parcialmente, de la descarga de recursos subterráneos de uno de los acuíferos que conforman la masa de agua subterránea. El buen estado de la MASb se conseguiría con un nivel piezométrico tal que la tasa media anual de extracción a largo plazo no rebase los recursos disponibles, y manteniendo un nivel en el acuífero vinculado a la zona húmeda que permita la descarga a la misma, independientemente de los niveles del resto de los acuíferos de la masa.
- Vinculación por descarga antrópica: el mantenimiento de las dos salinas de interior obliga al establecimiento de una cierta demanda medioambiental de escasa cuantía en el acuífero del que obtienen sus recursos. Dado que la alimentación a las salinas es antrópica mediante pozos no es necesaria la recuperación de los niveles piezométricos del acuífero ligado a los mismos.

Demandas ambientales por mantenimiento de caudales ecológicos:

Nombre	Tramo
Sinclinal de la Higuera	No se han definido demandas ambientales en esta masa de agua para el mantenimiento del caudal ecológico

Origen de la información de sistema de superficie asociados:

Estudio “Evaluación Preliminar de las Demandas Medioambientales de humedales y del recurso disponible en las masas de agua subterránea de la DHS”

Información Gráfica:

En el Anexo I se encuentra un mapa con las zonas hidráulicas y las vinculaciones con los sistemas de superficie asociados.

7. RECARGA

Componente	hm3/año	Periodo	Fuente de información
Infiltración de lluvia	3,0	Valor medio interanual	Plan Hidrológico de Cuenca corregido por estudios de cuantificación y sobreexplotación realizados por la OPH
Retorno de riego	0,5		
Otras entradas	0,0		

Observaciones sobre la Información de recarga:

Para la estimación de los recursos de cada acuífero se han adoptado las siguientes hipótesis de partida:

- La estimación del recurso disponible de cada acuífero de acuerdo con los balances del PHCS y del PHN, corregidos con los balances establecidos en los estudios de sobreexplotación desarrollados por la OPH.
- Se considera como recurso en las masas de agua que se identifiquen con unidades hidrogeológicas no compartidas las entradas por infiltración de lluvia y retornos de riego.
- Se considera que la incorporación de otras entradas y salidas a las masas de agua (infiltración cauces, embalses, entradas marinas, laterales y subterráneas fundamentalmente) no debe considerarse en el cálculo del recurso disponible ya que se producen debido a los bombeos en los acuíferos y son transferencias internas entre acuíferos de la cuenca. Tan sólo en el caso de masas de agua que reciban entradas de agua subterránea procedente de otras cuencas se procederá a contabilizar a estas entradas como recurso de la masa de agua.
- En el caso de las masas de agua derivadas de unidades hidrogeológicas compartidas con asignación de recursos del PHN (Jumilla-Villena, Sierra de la Oliva, Salinas, Quibas, Crevillente), se propone considerar como entradas a la acuífero el valor asignado por el PHN (que reparte el recurso procedente de la infiltración de lluvia a cada cuenca) y como valor de recarga de regadíos la parte proporcional de la recarga total de la unidad, asumiendo para la recarga de riego la misma proporcionalidad entre cuencas que la contemplada en el PHN para la lluvia. El PHN, para la asignación de recursos en unidades compartidas, ha seguido el criterio de repartir en función de las descargas en régimen natural (criterio indicado en el punto anterior) salvo que la unidad presente extracciones significativas, en cuyo caso se ha procedido a asignar recursos en función de la recarga.
- En el caso de masas de agua identificadas con unidades hidrogeológicas compartidas (pero no catalogadas como tales en el PHN), se propone calcular el recurso disponible de la unidad hidrogeológica y asignar el recurso disponible de la unidad a las diferentes masas de agua de cada cuenca en función de las descargas de la unidad en régimen natural. Si en la cuenca del Segura se aplicara estrictamente el criterio seguido por el PHN se debería reducir el recurso disponible de las unidades hidrogeológicas compartidas con el Júcar sin asignación de recursos del PHN y con extracciones significativas (Vega Media y Baja, Cingla-Cuchillos, Lácera, etc.). De la misma manera se deberían considerar la parte proporcional de los recursos disponibles de unidades hidrogeológicas compartidas con el Sur sin asignación de recursos por el PHN y con extracciones significativas (Saltador, Saliente, Sierra Almagro, etc.).
- En un único acuífero de la cuenca, Almirez, se ha procedido a considerar como recurso del mismo las infiltraciones del embalse del Cenajo, evaluadas por el PHCS en 15 hm^3/año. La consideración de estas infiltraciones como recurso se debe a que pueden emplearse para reducir las demandas ambientales de los acuíferos ubicados aguas debajo de la confluencia entre el Segura y el Mundo, de forma que el embalse del Cenajo tan sólo vierta el caudal ambiental del tramo Cenajo-confluencia y las pérdidas del embalse sirvan para la contabilidad de los caudales medioambientales del Segura aguas debajo de la confluencia con el Mundo. Así, la demanda ambiental del acuífero de Almirez se verá aumentada en el total del valor de las filtraciones del Cenajo, por lo que el sumatorio de recursos disponibles no se verá aumentado por la consideración de las surgencias.

8. RECARGA ARTIFICIAL

Esta masa de agua subterránea no contempla Recarga Artificial

9. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS

Extracciones de agua:

Extracciones	hm3/año	Periodo	Fuente de información
Extracciones totales	9,0	Valor medio interanual	Plan Hidrológico de Cuenca corregido por estudios de cuantificación y sobreexplotación realizados por la OPH

10. CALIDAD QUÍMICA DE REFERENCIA

Niveles de referencia:

No se considera ningún nivel de referencia al no contemplarse ningún riesgo de tipo químico en esta masa

Parámetro	Tipo	Valor de Referencia
Arsénico (mg/l)		
Cadmio (mg/l)		
Plomo (mg/l)		
Mercurio (mg/l)		
Amonio (mg/l)		
Cloruros (mg/l)		
Sulfatos (mg/l)		
Conductividad eléctrica 20ºC (µS/cm)		
Tricloroetileno (µg/l)		
Tetracloroetileno (µg/l)		

Niveles básicos:

No se considera ningún nivel básico al no contemplarse ningún riesgo de tipo químico en esta masa

Parámetro	Punto de Control	Acuífero	Nivel Básico
Arsénico (mg/l)			
Cadmio (mg/l)			
Plomo (mg/l)			
Mercurio (mg/l)			
Amonio (mg/l)			
Cloruros (mg/l)			
Sulfatos (mg/l)			
Conductividad eléctrica 20ºC (µS/cm)			
Tricloroetileno (µg/l)			
Tetracloroetileno (µg/l)			
Nitratos (mg/l)			
Plaguicidas totales (µg/l)			

11. EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO

Normas de calidad:

Contaminante	Normas de calidad
Nitratos	50 mg/l
Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los productos de degradación y reacción que sean pertinentes (1)	0,1 µg/l 0,5 µg/l (total) (2)

(1) Se entiende por «plaguicidas» los productos fitosanitarios y los biocidas definidos en el artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE y el artículo 2 de la Directiva 98/8/CE, respectivamente.
(2) Se entiende por «total» la suma de todos los plaguicidas concretos detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento, incluidos los productos de metabolización, los productos de degradación y los productos de reacción.

Valores umbral:

No se consideran valores umbral al no contemplarse riesgo de tipo químico en esta masa.

Evaluación del estado químico:

Esta masa, al no tener riesgo cualitativo y encontrarse en buen estado, los valores de nitratos y plaguicidas se encuentran por debajo de los umbrales fijados en las normas de calidad.

12. DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS DE CONTAMINANTES

Determinación de tendencias y definición de puntos de partida de inversiones de tendencias:


Esta masa, al no tener riesgo de tipo cualitativo, no presentará necesidad de inversión de tendencia ya que no alcanzará los niveles de inversión de la misma.

13.- USOS DEL SUELO

Actividad	Corine Land Cover 2000	
	Denominación	% en la masa
Aeropuertos	Aeropuertos	
Vías de transporte	Redes viarias, ferroviarias y terrenos asociados	
Zonas de regadío	Terrenos regados permanentemente	9
	Cultivos herbáceos en regadío	
	Otras zonas de irrigación	
	Arrozales	
	Viñedos en regadío	
	Frutales en regadío	
	Cítricos	
	Frutales tropicales	
	Otros frutales en regadío	
	Olivares en regadío	
	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en regadío	
	Mosaico de cultivos en regadío	
	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío	
	Mosaico de cultivos permanentes en regadío	
	Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en regadío	
	Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natura	
Zonas de secano	Tierras de labor en secano	71,90
	Viñedos en secano	
	Frutales en secano	
	Olivares en secano	
	Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en secano	
	Mosaico de cultivos en secano	
	Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano	
	Mosaico de cultivos permanentes en secano	
	Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en secano.	
	Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío	
	Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural	
	Cultivos agrícolas con arbolado adehesado	
Zonas quemadas	Zonas quemadas	
Zonas urbanas	Tejido urbano continuo	0,10
	Tejido urbano discontinuo	
	Estructura urbana abierta	
	Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas	
	Zonas en construcción	
	Zonas verdes urbanas	
Zonas industriales	Industrias y comercio	
Zonas mineras	Zonas de extracción minera	
Zonas recreativas	Instalaciones deportivas y recreativas	0,10
	Campos de golf	
	Resto de instalaciones deportivas y recreativas	
Praderas	Prados y praderas, Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de vegetación natur	18,90
	Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado	

Información gráfica:

- Mapa de usos del suelo



Mapa 13.1 Mapa de usos del suelo de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)

14.- FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN

Fuentes puntuales	Nº de instalaciones	Magnitud	
		Umbral	Parámetro
Vertederos de residuos no peligrosos			
Vertederos de inertes			
Vertedero de residuos peligrosos			
Instalaciones de gestión de residuos			
Depuradoras de aguas residuales			
Lagunas de efluentes líquidos			
Vertido en pozos			
Fosas sépticas	1		
Vertidos autorizados urbanos	2		
Vertidos autorizados agrarios			
Vertidos autorizados industriales			
Estaciones de servicio (gasolineras)	1		
Industrias IPPC			
Efluentes térmicos (generación electricidad)			
Escombreras mineras			
Balsas mineras			
Agua de drenaje de minas			
Agua de lavado de minerales			
Explotaciones ganaderas			
Acuicultura			
Residuos de proceso industrias agropecuarias			

Tabla orientadora para caracterización de presiones procedentes de fuente puntual:

Tipo	Magnitud	
	Umbral	Parámetro
Vertidos urbanos	2.000 h -e	– Caudal (m^3/año; m^3/mes y m^3/día) – Carga orgánica (DQO, DBO, COT), compuestos fósforo y nitrógeno (mg/L y g/año)
Vertidos biodegradables	4.000 h -e	– Caudal (m^3/año; m^3/mes y m^3/día) – Carga orgánica (DQO, DBO, COT), compuestos fósforo y nitrógeno (mg/L y g/año)
Vertidos industriales de actividades IPPC	Ser actividad IPPC	– Caudal (m^3/año; m^3/mes y m^3/día) – Contaminantes autorizados (mg/L y g/año) – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
Residuos mineros y aguas de agotamiento de mina	100 L/seg	– Caudal (m^3/año; m^3/mes y m^3/día) – Naturaleza del sector de producción – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
Vertidos de sales	100 t/día TSD	– Caudal (m^3/año; m^3/mes y m^3/día) – Sales (mg/L y g/año) – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
Vertido térmicos	Producción 10 MW	– Caudal (m^3/año; m^3/mes y m^3/día) – Temperatura del vertido (ºC) – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
Vertederos de residuos no peligrosos	Población 10.000 h.	– Caudal lixiviado – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
Vertederos de residuos peligrosos	Vertido de residuos peligrosos	– Caudal lixiviado – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
Vertederos de residuos no peligrosos	Existe evidencia de presión	– Caudal lixiviado – Carga orgánica (DQO, DBO, COT). – Compuestos de Nitrógeno y Fósforo – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
Gasolineras	Año de construcción	– Derivados del petróleo – Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA)


Tabla orientadora para caracterización de presiones procedentes de fuentes difusas:

Fuentes difusas	Superficie ocupada (ha)	Umbral % ocupado de la masa
Aeropuertos (1)		
Vías de transporte (1)		
Suelos contaminados (2)		
Infraestructura industria del petróleo (1)		
Áreas urbanas (2)	50,50	0,17
Zonas mineras (3)		
Áreas recreativas (6)		
Zonas de regadío (4)	2.647,00	8,90
Zonas de secano (4)	21.390,00	71,90
Zonas de ganadería extensiva (5)		

(1) PAHs,,hidrocarburos. Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
(2) Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año).
(3) Elementos y compuestos en función de la naturaleza de la explotación. Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)
(4) PO4, P total, NO3, NH3, N total. Plaguicidas
(5) Nº de cabezas /ha Carga orgánica (DQO,DBO, COT) NO3, NH3, N total
(6) Carga orgánica (DQO,DBO, COT), compuestos de fósforo y nitrógeno (mg/L y g/año), plaguicidas Sustancias prioritarias y otros contaminantes significativos (Anexo VIII de la DMA) (mg/L y g/año)

Información gráfica:

- Mapa de situación de actividades potencialmente contaminantes



Mapa 14.1 Mapa de actividades potencialmente contaminantes de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)

15.- OTRAS PRESIONES

Actividad	Identificación	Localización	Descripción y efecto en la masa de agua subterránea
Modificaciones morfológicas de cursos fluviales			
Sobreexplotación en zona costera			


Observaciones:

Origen de la información:

Biblioteca	Cod. Biblioteca	Fecha	Título
IGME		1987	INVENTARIO NACIONAL DE BALSAS Y ESCOMBRERAS

Información gráfica:


- Mapa de situación de otras presiones



Mapa 15.1 Mapa de inventario de azudes y presas de la masa Sinclinal de la Higuera (070.002)

16.-OTRA INFORMACIÓN GRÁFICA Y LEYENDAS DE MAPAS

Unidad cartográfica



IDENTIFICACIÓN DE SUELOS

La unidad taxonómica de suelo (versión del año 2003 de *Soil Taxonomy*) constituye el contenido de la unidad cartográfica y está formada por uno o dos suelos principales (40–60 %), uno o dos suelos asociados (15–40 %) y una o dos inclusiones (< 15 %).

La leyenda se ha ordenado de acuerdo con la taxonomía de los suelos principales, asociados e inclusiones en ese orden.

El suelo principal (grupo 1 o grupo 1 + grupo 2) proporciona el color a cada conjunto de unidades cartográficas que aparecen juntas en la leyenda.


Sólo se ha indicado el nombre del suborden en el primer conjunto de unidades cartográficas. En el resto sólo aparecen, si procede, los nombres del grupo, asociación e inclusiones para cada unidad cartográfica.

Consulta ejemplo: suelo con código 91 — orden: Entisol; grupo 1: Torriorthent; asociación 1: Haplocalcid; inclusión 1: Haplargid — suborden: Orthent; grupo 2: no tiene; asociación 2: no tiene; inclusión 2: Petrocalcid


LEYENDA - CORINE, 2000

- Otras zonas de irrigación (2.1.2.2.0)
- Humedales y zonas pantanosas (4.1.1.0.0)
  Turberas y prados turbosos (4.1.2.0.0)
  Marismas (4.2.1.0.0)
  Salinas (4.2.2.0.0)
- Mares y océanos (5.2.3.0.0)
- Zonas llanas intermareales (4.2.3.0.0)
  Ríos y cauces naturales (5.1.1.1.0)
  Canales artificiales (5.1.1.2.0)
  Lagos y lagunas (5.1.2.1.0)
  Embalses (5.1.2.2.0)
  Lagunas costeras (5.2.1.0.0)
  Estuarios (5.2.2.0.0)
- Glaciares y nieves permanentes (3.3.5.0.0)
- Otros pastizales (3.2.1.2.0)
- Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en secano (2.4.1.1.0)
  Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano (2.4.2.1.1)
  Mosaico de cultivos permanentes en secano (2.4.2.1.2)
  Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en secano (2.4.2.1.3)
- Matorrales xerófilos macaronésicos (3.2.2.2.0)
  Matorral boscoso de frondosas (3.2.4.1.0)
  Matorral boscoso de coniferas (3.2.4.2.0)
  Matorral boscoso de bosque mixto (3.2.4.3.0)
- Espacios de vegetación escasa (3.3.3.0.0)
- Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y semi-natural (2.4.3.1.0)
- Playas y dunas (3.3.1.0.0)
- Mosaico de cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en regadío (2.4.1.2.0)
  Mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en regadío (2.4.2.2.1)
  Mosaico de cultivos permanentes en regadío (2.4.2.2.2)
  Mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en regadío (2.4.2.2.3)
  Mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío (2.4.2.3.0)
- Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con espacios significativos de vegetación natural y semi-natural (2.4.3.2.0)
- Pastizales supraforestales templado oceánicos, pirenicos y orocantábricos (3.2.1.1.1)
  Pastizales supraforestales mediterráneos (3.2.1.1.2)
  Otros pastizales templado oceánicos (3.2.1.2.1)
  Otros pastizales mediterráneos (3.2.1.2.2)
- Zonas quemadas (3.3.4.0.0)
- Tierras de labor en secano (2.1.1.0.0)
- Viñedos en secano (2.2.1.2.0)
- Arrozales (2.1.3.0.0)
- Landas y matorrales en climas húmedos. Vegetación mesófila (3.2.2.1.0)
- Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso (3.2.3.1.1)
  Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos (3.2.3.1.2)
- Ramblas con poca o sin vegetación (3.3.1.2.0)
- Olivares en secano (2.2.3.1.0)
- Rocas desnudas con fuerte pendiente (acantilados, etc) (3.3.2.1.0)
  Afloramientos rocosos canchales (3.3.2.2.0)
  Xeroestepa subdesértica (3.3.3.1.0)
  Carcavas y/o zonas en proceso de erosión (3.3.3.2.0)
  Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa (3.3.3.3.0)
- Olivares en regadío (2.2.3.2.0)
- Viñedos en regadío (2.2.1.2.0)
- Frutales en secano (2.2.2.1.0)
- Cítricos (2.2.2.2.1)
  Frutales tropicales (2.2.2.2.2)
  Otros frutales en regadío (2.2.2.2.3)
- Cultivos herbáceos en regadío (2.1.2.1.0)
- Praderas (2.3.1.0.0)
- Zonas verdes urbanas (1.4.1.0.0)
  Restos de instalaciones deportivas y recreativas (1.4.2.0.0)
  Campos de golf (1.4.2.1.0)
- Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado (2.4.4.1.0)
  Cultivos agricolas con arbolado adehesado (2.4.4.2.0)
  Mosaico de prados o praderas con espacios significativos de vegetación natural y semi-natural (2.4.3.3.0)
- Perennifolias (3.1.1.1.0)
  Caducifolias y marcescentes (3.1.1.2.0)
  Otras frondosas de plantación (3.1.1.3.0)
  Mezcla de frondosas (3.1.1.4.0)
  Bosque de ribera (3.1.1.5.0)
  Bosque de coniferas con hojas aciculares (3.1.2.1.0)
  Bosque de coniferas con hojas de tipo cupresáceas (3.1.2.2.0)
  Bosque mixto (3.1.3.0.0)
- Zona de extracción minera (1.3.1.0.0)
  Escombreras y vertederos (1.3.2.0.0)
- Zonas industriales (1.2.1.1.0)
  Grandes superficies de equipamientos y servicios (1.2.1.2.0)
  Autopistas, autovías y terrenos asociados (1.2.2.1.0)
  Complejos ferroviarios (1.2.2.2.0)
  Zonas portuarias (1.2.3.0.0)
  Aeropuertos (1.2.4.0.0)
- Tejido urbano continuo (1.1.1.0.0)
  Estructura urbana abierta (1.1.2.1.0)
  Urbanizaciones exentas y/o ajardinadas (1.1.2.2.0)
  Zonas en construcción (1.3.3.0.0)


LEYENDA DEL MAPA LITOESTRATIGRÁFICO
1:200.000




701 Gravas cuarcíticas, arenas silíceas y arcillas (Depósitos de rañas y otros aluviales fineníegenos)
702 Costras calcáreas. Dalles y costras laminares bandeadas y multacintadas
703 Gravas, arenas, arcillas y limos (Depósitos de glacis, piedemonte y superficies)
704 Gravas, arenas, limos y arcillas (Depósitos de terrazas medias y altas)
705 Bloques, cantos, limos y arcillas (Depósitos de ladera, coluviones, morrenas)
706 Gravas, arenas, limos(Depósitos de aluviales, fondos de valle y terrazas bajas en los ríos princ.)
707 Arcillas (Rellenos de depresiones kársticas)
708 Travertinos
709 Arenas, limos arenosos y arcillas amarillentas
710 Conglomerados, arenas y arcillas
711 Bloques, cantos, arcillas (Depósitos glaciares, canchales, coluviones de montaña)
712 Limos, arcillas, materia orgánica y sales (Depósitos de estuario, marismas y sedim. Litorales)
713 Arenas y gravas (Cordones litorales y playas)
714 Arcillas, limos y cantos, turba (Depósitos de áreas endorreicas, dep. lacustres, turberas)
715 Salinas
716 Gravas, arenas, limos, arcillas, limolitas, calizas (Cuaternario indiferenciado)




221 Marg.salmón y mgcz.con silex; marg.blancas, caliz.nummul.;marg.verdes y rojas con int.calcar.
224 Calizas con nummulites, margas y areniscas
301 Arenas y conglomerados
302 Arcillas, margas y calizas
303 Arenas y arcillas
304 Margas y calizas
305 Conglomerados, gravas, arenas y lutitas rojas
307 Gravas, arenas, lutitas. Calizas y margas
308 Conglomerados, gravas, arenas y lutitas rojas
309 Basaltos, nefelinitas y volcanoclásticos
310 Arenas, arcillas y conglomerados
311 Arenis.cuarc.,gravas silíc.,conglom.,arcillas rosadas, caliz.,limolitas, y a veces yesos (Garumn)
312 Arenis.y microcongl.silíc., con rubefacc.(Series Siderolíticas, Ar.de Salamanca, Ud.Torreros)
313 Arcosas, conglom. y arcillas (Ar. de Cabrerizos y Villamayor).Lut.y arenisc.rojas (F.Aldearrubia)
314 Margas y arcillas blancas. Margas de Sanzoles
315 Calizas y margas. Calizas de Cubillos
316 Arenis., lim.y congl.ocres (Ar.Toro-Corrales,Limos de Geroma,Congl.Villalazán,G.Sup-Inf Paleóg.
317 Conglomerados y areniscas
318 Arcillas y limos
319 Brech.,conglom.,lut.(cantos plut.o paleoz)(F.Olalla, Calzadilla,Peñalba,Escalonilla,Mingorría,etc.)
320 Conglomer.,areniscas y arcillas, rojos(Facies Roja de Toro y Aspariegos, Conglom. de Belver)
321 Arcosas y lim.arc., blanc., gris-verd.u ocres, con costras (Pedraja Port.,Vill.Adaja,Pte.Runel...)
322 Lutitas arcósicas rojizas, con cantos cuarcíticos y arenas (Facies Peromingo)
323 Lutitas rojas con niv.conglom.,arenis. y costras calcáreas(F.Sta María Campo y U.Detz Aranda)
324 Conglomerados fcmte.calcáreos, areniscas y arcillas rojas y pardas(Compl.Vegaquemada,etc.)
325 Margas, margocalizas y arcillas (Facies Dueñas)
326 Margas yesíferas y yesos (Facies Villatoro)
327 Calizas y margocalizas (Calizas "terminales" de Dueñas)
328 Limos y arenas ocres, con nivs.congl.y costras (F.Tierra de Campos, Serna, Villalp.-Sahag.)
329 Conglom.calcár. y arc.rojizas (F. Alar del Rey, Compl. Cuevas, Facies Covarrubias)
330 Calizas (Calizas "terminales de Tierra de Campos", al este de Burgos)
331 Margas, margocalizas y arcillas (Facies Cuestas)
332 Calizas y dolomías (Calizas "intra-Cuestas", Calizas de Arévalo)
333 Margas yesíferas y yesos (Facies Cuestas)
334 Arcillas rojas, con intercalaciones de areniscas, margas , calizas y costras (F. Tordómar)
335 Calizas y margas (Calizas del Páramo 1 o inferior)
336 Margas, limos, arenas y arcillas, ocres o rojas
337 Gravas silíceas, conglomerados cuarcíticos y arenas (Ab.Cantoral,Guardo,Cegoñal,Vidanes)
338 Calizas, margocalizas y brechas calcáreas y oncolíticas(Calizas del Páramo 2)
339 Conglomerados cuarcíticos, gravas y arenas silíceas y arcillas (Rañas y otros aluviales fineníegenos)
340 Calcarenitas, calizas, dolomías y margas
341 Megabrechas
342 Lutitas y areniscas (Flysch)
343 Calizas y margas
344 Areniscas y lutitas. Areniscas de Gongolaz
345 Conglomerados
346 Margas y margocalizas
347 Sales potásicas
348 Alternancia de areniscas y lutitas, localmente conglomerados
349 Calizas, localmente con lutitas
350 Lutitas, con intercalaciones de yesos y carbonatos
351 Conglomerados, con intercalaciones de areniscas y lutitas
352 Conglomerados, con intercalaciones de areniscas, margas y niveles de yeso
353 Areniscas, lutitas, margas y, localmente, conglomerados
354 Arcillas y margas, con intercalaciones de areniscas y calizas
355 Yesos y arcillas, con alguna intercalación de halita
356 Arcillas, yesos, carbonatos, areniscas y, a veces, conglomerados
357 Calizas, localmente con lutitas
358 Conglomerados, con intercalaciones de areniscas y lutitas
359 Conglomerados, areniscas y lutitas
360 Alternancia de areniscas y lutitas, localmente conglomerados
361 Lutitas con intercalaciones de areniscas
362 Lutitas y areniscas, a veces con yesos y calizas
363 Lutitas y margas, con intercalaciones de calizas y yesos
364 Yesos con intercalaciones de lutitas
365 Calizas, localmente con lutitas
366 Conglomerados, areniscas, lutitas y a veces margas y calizas
367 Alternancia de areniscas y lutitas, localmente conglomerados
368 Lutitas con intercalaciones de areniscas
369 Lutitas con intercalaciones de yesos y carbonatos
370 Yesos con intercalaciones de lutitas
371 Calizas, localmente con lutitas
372 Conglomerados, areniscas, lutitas y a veces margas
373 Alternancia de areniscas y lutitas, localmente conglomerados
374 Lutitas con intercalaciones de areniscas
375 Lutitas con niveles de calizas y, a veces, yesos
376 Yesos con intercalaciones de lutitas
377 Calizas, localmente con lutitas
378 Conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas. Costras a techo
379 Arenas y gravas. Fangos variolados
380 Conglomerados, limos, arenas y lutitas
381 Conglomerados, areniscas, lutitas y calizas
382 Calizas, margas y calizas margosas. Intercalaciones de lutitas y conglomerados
383 Yesos
386 Areniscas, conglomerados y calizas
387 Calizas y margas
388 Conglomerados, arenas y lutitas
389 Calizas y margas
390 Brechas calcáreas, conglomerados, areniscas arcillas y calizas
391 Yesos, margas, arcillas y calizas
392 Conglomerados
393 Conglomerados y areniscas, con arcillas y limos rojos
394 Arcillas rojas y areniscas. Conglomerados y calizas, subordinados
395 Arcillas, limos y arenas, con intercalaciones de areniscas y calizas
396 Margas y calizas
397 Conglomerados, areniscas, lutitas, margas, calizas y lignitos
398 Arcillas con cantos y gravas, conglomerados y areniscas
399 Brechas calcáreo-dolomíticas, rojizas, generalmente con cemento calizo
400 Arcosas con cantos, conglomerados y arcillas
401 Lutitas y yesos, con arcillas y areniscas
402 Arcosas a veces con cantos, con lutitas, margas, calizas y, localmente nód. de sílex y yeso
403 Lutitas, areniscas, conglomerados y, a veces, calizas
404 Lutitas, margas blancas y niveles carbonatados
405 Conglomerados y calizas travertínicas
406 Calizas y margas blancas, a veces con nódulos de sílex y lignitos
407 Calizas, calizas margosas y margas
408 Margas yesíferas y yesos, con arcillas, arenas y, eventualmente margas, calizas y sílex
409 Niveles de sílex y sepiolita
410 Calizas, dolomías y margas
411 Conglomerados, areniscas y lutitas
412 Arcosas gruesas, a veces con cantos, limos y fangos arcósicos
413 Margas, arcillas, yesos, conglomerados, areniscas
414 Lutitas rojas y conglomerados. Lutitas y arenas ocres
415 Calizas y margas
416 Yesos y margas
417 Arcillas y lutitas (a veces, con cantos y yesíferas), areniscas y conglomerados
418 Calizas, margas, areniscas y limolitas
419 Calizas (a veces nummulíticas), areniscas, conglomerados, margas y arcillas
420 Conglomerados, arenas, arcillas, calizas y yesos
421 Margas y margocalizas
422 Calizas, margas, limolitas, areniscas y conglomerados
423 Conglomerados poligénicos, areniscas y arcillas rojas
424 Unidad oligotrombínica-tectonosómica
425 Areniscas silíceas hacia la base, y margas blancas a techo
426 Calizas de algas, y margas blancas
427 Calcarenitas
428 Turbiditas
429 Margas ("Margas Azules")
430 Conglomerados, gravas, arenas y limos (Formación Roja)
431 Conglomerados, brechas calcáreas, calcarenitas, areniscas y arenas (Facies de borde)
432 Margas ("Azules"), areniscas, arenas y, a veces, yesos
433 Calcarenitas, arenas, gravas, limos y arcillas
434 Conglomerados, areniscas y calcarenitas (Facies de borde)
435 Conglomerados, arenas, arcillas, calizas, travertinos y yesos (Facies fluvio-lacustres)
436 Rocas volcánicas peralcalinas
437 Conglomerados, arenas y limos
438 Calizas arrecifales y calcarenitas
439 Conglomerados, arenas y limos
440 Conglomerados, arenas y limos rojos
441 Yesos, con arcillas yesíferas y, a veces, margas y limolitas
442 Limos con intercalaciones de margas. Calcarenitas y conglomerados
443 Conglomerados, areniscas y lutitas (Flysch)
444 Dolomías, calizas y margas



58 Areniscas, conglomerados y lutitas, rojos (Facies Buntsandstein)
131 Filitas, cuarcitas, micasquistos y yesos
132 Mármoles
133 Micasquistos, cuarcitas y gneises
134 Metabasitas (diabasas, serpentinitas, anfibolitas)
135 Mármoles
136 Calizas, dolomías y mármoles
137 Dolomías, calizas y margas (F. Muschelkalk)
138 Lutitas rojas, con niveles de yeso y dolomías
139 Lutitas rojas, areniscas, conglomerados, margas, dolomías y yesos
140 Areniscas
141 Arcillas abigarradas y yesos, a veces con margas y areniscas (F. Keuper)
143 Dolomías
144 Dolomías y calizas
145 Conglomerados, areniscas, arenas, y a veces calizas, dolomías y margas
146 Arcillas y areniscas
147 Calizas, dolomías y margas
148 Lutitas y margas
149 Lutitas, areniscas, conglomerados y, a veces, calizas arenosas
150 Dolomías, calizas dolomíticas y calizas
152 Areniscas, arenas, calizas arenosas, margas, arcillas y margocalizas
153 Areniscas, lutitas y margas
154 Areniscas
154a Calizas y dolomías
154b Margas
154c Calizas, margas y calcarenitas
155 Rocas volcánicas
156 Dolomías y calcarenitas
157 Dolomías, brechas dolomíticas, carniolas y calizas en bancos (Fm. Cortes de Tajuña)
158 Calizas grises con crinoides
159 Margas, calizas bioclásticas y margosas. Fm. Margas Cerro del Pez, etc.
160 Calizas generalmente oolíticas, con nódulos de sílex y, a veces, margas (Fm.Carb. de Chelva)
161 Margas, calizas y margocalizas
163 Calizas oncolíticas y pisolíticas
164 Dolomías y calizas
165 Calizas de oncolitos. Calizas de Higueruelas
166 Conglomerados, areniscas, limolitas y calizas oolíticas. Facies Purbeck
167 Calizas, dolomías y margas. Facies Purbeck
169 Calizas, calizas margosas y margas. Facies Weald
170 Ortoconglomerados, arcillas, margas y calizas
171 Arcillas y limolitas. Facies Weald
172 Calizas, dolomías, arcillas, areniscas y margas abigarradas. Facies Weald
173 Calizas arrecifales, con rudistas, calizas bioclásticas, dolomías y margas
174 Margas, calizas, arcillas y dolomías
175 Arenas, arcillas, gravas y conglomerados (F.Utrillas), a veces con dolomías (F.Ar.yArc.Segovia)
176 Calizas oquerosas rojizas y margas blancas
177 Lutitas y areniscas (Facies Flysch)
178 Brechas y oliostromna
179 Areniscas y conglomerados
180 Calizas blancas con rudistas
181 Calizas, calizas oolíticas, margas, brechas y dolomías
182 Dolomías
183 Calizas, calizas margosas y margas
184 Calizas, margas y areniscas
185 Arenas, areniscas, arcillas, calizas y margas. Facies Purbeck
187 Calizas, margas, arcillas y areniscas
189 Margas, calizas y areniscas
191 Margas y calizas
192 Arenas, areniscas y calizas con Toucasias y orbitolinas
193 Margas, calizas, calizas bioclásticas y/o arenosas y areniscas
194 Arenas y arcillas, con lignitos. Fm. Escucha
196 Arenas, margas y calizas
197 Calizas, dolomías, margas (Dol.Villa de Ves, Caballar;F.Tablad/do,Hontoria; Mgas.Chera)
198 Dolomías masivas. Dolomías de la Ciudad Encantada
199 Margas con niveles dolomíticos.Fm. Margas de Alarcón
200 Conglomerados y arcillas rojas (Zona de Sigüenza)
201 Calizas, dolomías, brechas dolomíticas y margas
203 Arcillas, margas, yesos masivos y, localmente, arenas y gravas. Fm. Villalba de la Sierra
204 Calizas de gasterópodos, margas, margocalizas y, a veces, conglomerados y yesos
205 Conglomerados, arenas y limos con silice
206 Dolomías, calizas y margas
207 Calizas, margas, margocalizas, calcarenitas, calizas nodulosas y calizas oolíticas
208 Calizas, margas, arenas silíceas, arcillas, calcarenitas, margocalizas
209 Calizas, calcarenitas, arenisicas, margas y limos
211 Calizas, calizas con sílex, margocalizas, margas y margocalizas, con coladas basálticas
212 Margas, margocalizas, radiolaritas y rocas volcánicas
213 Calizas, dolomías y margas
215 Margas y margocalizas, a veces con arenas
216 Calizas
217 Dolomías, calizas y arenas
218 Calizas con nummulites, margas y areniscas
219 Dolomías y, eventualmente, calizas
220 Margocalizas y calizas
221 Margas color salmón y margocalizas con sílex; mgas.blancas verdes y rojas, con int.calcáreas
222 Dolomías, calizas oolíticas y margocalizas
223 Margas y margocalizas
346 Margas y margocalizas
340 Calizas, calcarenitas, dolomías y margas
348 Alternancia de areniscas y lutitas, localmente conglomerados
421 Margas y margocalizas



16 Esquistos negros, pizarras, cuarcitas negras, migmatitas, anfibolitas, paragneises. Serie Negra
17 Pizarras, areniscas, cuarcitas y, a veces, lentejones de carbonatos
18 Rocas volcánicas ácidas y básicas, pizarras, areniscas y jaspes. Complejo volcano-sediment.
19 Pizarras, grauvacas y areniscas, a veces con calizas y rocas volcánicas. Facies Culm
20 Conglomerados, areniscas, lutitas rojas, carbón y rocas volcánicas básicas. Cuenca de Viar
21 Ortoanfibolitas. Complejo ofiolítico de Beja
22 Anfibolitas y esquistos verdes
23 Pelitas con metagrauvacas, ortocuarcitas, tobas (y metabasaltos, en la base).Fm. Pulo do Lobo
24 Pizarras y grauvacas. Flysch de Santa Iria
25 Rocas volcánicas ácidas, lutitas, areniscas y conglomerados. Complejo Volc.-Sed.Malcocinado
26 Cuarcitas, pizarras, paragneises y micasquistos. Formación Abarrana
27 Filitas y metareniscas. Formación Azuaga
28 Areniscas arcósicas, esquistos, lutitas, conglom. y rocas volc. Series Detríticas Inf. y Sup.
29 Calizas marmóreas. Serie carbonatada de la Z. Ossa-Morena y Calizas de Urda
30 Metarcosas, migmatitas y micasquistos, con rocas volcánicas intercaladas
31 Pizarras grises y moradas, y metavulcanitas básicas
32 Espilitas y basaltos. Serie volcánica de Umbría-Pipeta
33 Pizarras y areniscas. Formación Fatuquedo
34 Areniscas cuarcíticas, pizarras, limolitas, calizas y margas. Formación Barrancos
35 Pizarras ampelíticas, a veces con lidítas (y areniscas: Fm. Cañamares y Alcolea)
36 Pizarras, areniscas, cuarcitas y, a veces, calizas y rocas volcánicas. Flysch de Terena
154b Margas
154c Calizas, margas y calcarenitas
155 Rocas volcánicas
156 Dolomías y calcarenitas
157 Dolomías, brechas dolomíticas, carniolas y calizas en bancos (Fm. Cortes de Tajuña)
158 Calizas grises con crinoides
159 Margas, calizas bioclásticas y margosas. Fm. Margas Cerro del Pez, etc.
160 Calizas generalmente oolíticas, con nódulos de sílex y, a veces, margas (Fm.Carb. de Chelva)
161 Margas, calizas y margocalizas
163 Calizas oncolíticas y pisolíticas
164 Dolomías y calizas
165 Calizas de oncolitos. Calizas de Higueruelas
166 Conglomerados, areniscas, limolitas y calizas oolíticas. Facies Purbeck
167 Calizas, dolomías y margas. Facies Purbeck
169 Calizas, calizas margosas y margas. Facies Weald
170 Ortoconglomerados, arcillas, margas y calizas
171 Arcillas y limolitas. Facies Weald
172 Calizas, dolomías, arcillas, areniscas y margas abigarradas. Facies Weald
173 Calizas arrecifales, con rudistas, calizas bioclásticas, dolomías y margas
174 Margas, calizas, arcillas y dolomías
175 Arenas, arcillas, gravas y conglomerados (F.Utrillas), a veces con dolomías (F.Ar.yArc.Segovia)
176 Calizas oquerosas rojizas y margas blancas
177 Lutitas y areniscas (Facies Flysch)
178 Brechas y oliostromna
179 Areniscas y conglomerados
180 Calizas blancas con rudistas
181 Calizas, calizas oolíticas, margas, brechas y dolomías
182 Dolomías
183 Calizas, calizas margosas y margas
184 Calizas, margas y areniscas
185 Arenas, areniscas, arcillas, calizas y margas. Facies Purbeck
187 Calizas, margas, arcillas y areniscas
189 Margas, calizas y areniscas
191 Margas y calizas
192 Arenas, areniscas y calizas con Toucasias y orbitolinas
193 Margas, calizas, calizas bioclásticas y/o arenosas y areniscas
194 Arenas y arcillas, con lignitos. Fm. Escucha
196 Arenas, margas y calizas
197 Calizas, dolomías, margas (Dol.Villa de Ves, Caballar;F.Tablad/do,Hontoria; Mgas.Chera)
198 Dolomías masivas. Dolomías de la Ciudad Encantada
199 Margas con niveles dolomíticos.Fm. Margas de Alarcón
200 Conglomerados y arcillas rojas (Zona de Sigüenza)
201 Calizas, dolomías, brechas dolomíticas y margas
203 Arcillas, margas, yesos masivos y, localmente, arenas y gravas. Fm. Villalba de la Sierra
204 Calizas de gasterópodos, margas, margocalizas y, a veces, conglomerados y yesos
205 Conglomerados, arenas y limos con silice
206 Dolomías, calizas y margas
207 Calizas, margas, margocalizas, calcarenitas, calizas nodulosas y calizas oolíticas
208 Calizas, margas, arenas silíceas, arcillas, calcarenitas, margocalizas
209 Calizas, calcarenitas, arenisicas, margas y limos
211 Calizas, calizas con sílex, margocalizas, margas y margocalizas, con coladas basálticas
212 Margas, margocalizas, radiolaritas y rocas volcánicas
213 Calizas, dolomías y margas
215 Margas y margocalizas, a veces con arenas
216 Calizas
217 Dolomías, calizas y arenas
218 Calizas con nummulites, margas y areniscas
219 Dolomías y, eventualmente, calizas
220 Margocalizas y calizas
221 Margas color salmón y margocalizas con sílex; mgas.blancas verdes y rojas, con int.calcáreas
222 Dolomías, calizas oolíticas y margocalizas
223 Margas y margocalizas
346 Margas y margocalizas
340 Calizas, calcarenitas, dolomías y margas
348 Alternancia de areniscas y lutitas, localmente conglomerados
421 Margas y margocalizas



601 Lavas y pirocl. basált.(en parte subm.) con sedimentos de fondo oceánico (detr.y carb.) subord.
602 Wehrlitas, piroxenitas, gabros, ijolitas y sienitas, subordinadas. Intrusivos sálicos indiferenciad.
603 Wehrlitas, piroxenitas y gabros
604 Coladas basálticas submarinas, domos-coladas sálicos, gabros
605 Coladas basálticas y brechas polimícticas con intensa malla de diques
606 Intrusiones subvolcánicas de diques traquíticos y traquibasálticos
607 Gabros, leucogabros, sienitas, con tobas y brechas sálicas subordinadas. Intrusivos traquíticos
608 Coladas, conos de tefra y piroclastos de dispersión basált. Frecuentes diques básicos
609 Coladas,conos de tefra basált.y brechas lit.polimic. heteromet.Pocos diques.Int.básicos y traq.
610 Coladas y conos de tefra basált.Con coladas traquibasált. y sedimentos detríticos subordinados
611 Coladas y piroclastos basált. Intrusivos básicos intercalados
612 Coladas basálticas, basanlíticas y nefelínlíticas, con piroclástos intercal. e intrusiv.básic.subord.
613 Coladas basálticas con piroclastos intercalados
614 Coladas basálticas con piroclastos intercalados
615 Coladas y conos de tefra basált.Con coladas basanlíticas subordin.y piroclastos de dispersión
616 Arenas y conglomerados aluviales y marinos. Arenas eólicas subordinadas
617 Coladas,conos de tefra y pirocl.disp.basált. -traquibasált.(basanit.-tefrit.) con col.fonolit.subord.
618 Coladas,conos de tefra y pirocl.disp.basált. -traquibasált.(basanit.-tefrit.-fonol.)
619 Coladas,conos de tefra y pirocl.disp.basált. -traquibasált.(basanit.-tefrit.-fonol.)
620 Sienitas alcalinas
621 Tobas ignimbríticas y coladas riolítico-traquíticas. Diques sálicos en más del 65%
622 Tobas ignimbríticas y coladas riolítico-traquíticas. Diques sálicos entre 10-65%
623 Tobas ignimbríticas y coladas riolítico-traquíticas. Diques sálicos subordinados
624 Brecha polimíctica y heterométrica
625 Coladas riolíticas y traquíticas con fonolitas subord. Tobas y brechas ignimbríticas peralcalinas
626 Coladas e ignimbr.fonolíticas. Intrusivos fonolíticos y coladas piroclásticas. Ash&pumice subord.
627 Conglomerados y arenas aluviales. Facies de conglomerados y arenas marinas subordinados
628 Coladas (y piroclastos) basálticas, basanlíticas y tefríticas
629 Coladas basálticas alternando con brechas polimícticas soldadas
630 Brecha polimíctica y heterométrica soldada
631 Brechas caóticas de deslizamiento, con matriz arcill.-aren. y materiales epiclásticos subordin.
632 Coladas y conos de tefra basan.,nefelin.y tefríticas. Basaltos subordinados
633 Coladas y conos de tefra basan.,nefelin. y tefríticas. Basaltos subordinados
634 Coladas y conos de tefra basanlíticos, tefríticos y tefrítico-fonolíticos
635 Arenas y conglomerados marinos, fosilíferos
636 Coladas y conos de tefra basanlíticos. Piroclastos de dispersión subordinados
637 Conos de tefra basálticos
638 Coladas basálticas con niveles piroclásticos subordinados
639 Coladas de composición intermedia y fonolitas málficas. Brechas y domos subordinados
640 Coladas y conos de tefra basált.(basan.y traquibas.).Intrusiv.básicos y sálicos, y brech.lit.sub.
641 Coladas basálticas, traquibasálticas y fonolíticas. Piroclastos sálicos subordinados
642 Coladas e ignimbr.traquíticas y fonolíticas. Coladas basálticas y traquibasálticas subordinadas.
643 Coladas basálticas, traquibasálticas y fonolíticas.
644 Coladas y piroclastos basálticos. Diques básicos en la parte inferior
645 Coladas y piroclastos basálticos. Intrusivos sálicos subordinados
646 Coladas, aglutinados, pumitas e ignimbritas fonolíticas
647 Tobas sálicas, coladas fonolíticas e ignimbritas no consolidadas
648 Piroclastos sálicos indiferenciados
649 Coladas basálticas y traquibasálticas, con conos de tefra subordinados
650 Coladas basálticas y traquibasálticas.
651 Domos y coladas fonolíticas. Piroclastos de caída, sálicos, subordinados
652 Coladas básicas, traquibasálticas y traquifonolíticas
653 Coladas, conos y domos fonolíticos. Coladas y conos basálticos subordinados
654 Coladas y conos de tefra basálticos. Domos sálicos y brechas líticas basálticas, subordinados
655 Coladas y con. de tefra basált., atravesados por diques, altern.con brechas, o con intrusiv.básic.
656 Intrusiones filonianas sálicas, sienitas y pitones fonolíticos. Depósitos pirocl.sálicos subordin.
657 Depósitos de brechas y tobas, polimícticos y poligénicos, preferentemente sálicos
658 Coladas y con.tefra basált.y traquib.Traquitas, basált.e intrusiv.sálicos y bísicos subor.
659 Intrusivos traquíticos y fonolíticos
660 Coladas y piroclastos basálticos, con intrusivos basálticos subordinados
661 Coladas y piroclastos basálticos, con muchos diques básicos. Sediment.y brechas subordinad.
662 Coladas y conos de tefra basálticos y, a veces, basanlíticos y tefríticos
663 Coladas y pirocl.basált.(basan.y tefr.) con intrusiv. básicos, y coladas tefríticas tardías subord.
664 Coladas y conos de tefra, basálticos y tefríticos
665 Coladas y conos de tefra basálticos, tefríticos y fonolíticos
666 Coladas y conos de tefra basálticos, traquibasálticos, basanlíticos y tefríticos
667 Coladas y con. de tefra basálticos, traquibasálticos, basanlíticos y tefríticos, con coladas traquit.
668 Coladas y conos de tefra basálticos y, subord., basanlíticos, tefríticos y fonolíTéicos.
669 Arenas eólicas sueltas
670 Depósitos detríticos aluviales, de vertiente (incluidos epiclásticos y gravitacionales) y playas.
671 Intrusivos y coladas cuarzotraquíticas

1 ROCAS BÁSICAS METAMORFIZADAS Y PERIDOTITAS (metabasitas, anfibolitas, serpentinitas)
2 ROCAS ÁCIDAS METAMORFIZADAS (Ortogneises, migmatitas). Gn. gland., metarriolitas (Ollo Sapo). Gn.peralcal.
3 ROCAS VOLCÁNICAS CAMBRO-ORDOVÍCICAS Y STOCKS SUBVOLCÁNICOS TARDIHERCÍNICOS
4 ROCAS VOLCÁNICAS Y SUBVOLCÁNICAS PALEOZOICAS
5 ROCAS PIROCLÁSTICAS ("EXPLOSIVAS") PALEOZOICAS
6 ROCAS PLUTÓNICAS ÁCIDAS, HERCÍNICAS (granitos, granodioritas, cuarzodioritas)
7 ROCAS PLUTÓNICAS BÁSICAS, HERCÍNICAS (gabros, dioritas, tonalitas, rocas ultramáficas)
8 ROCAS FILONIANAS ÁCIDAS, HERCÍNICAS (pórfidos, aplitas)
9 ROCAS VOLCÁNICAS ÁCIDAS (coladas dacíticas y tobas riolíticas)
10 ROCAS FILONIANAS BÁSICAS E INTERMEDIAS, HERCÍNICAS O TARDIHERCÍNICAS (diabasas, lamprófidos)
11 FILONES DE CUARZO
12 OFITAS DEL KEUPER
13 GABRO-DIABASAS DEL DIQUE DE PLASENCIA
14 TOBAS VOLCÁNICAS DEL JURÁSICO
15 LAMPROÍTAS
717 ROCAS VOLCÁNICAS DE OLOT (tobas volcánicas, basaltos, brechas piroclásticas)
718 COLADAS LÁVICAS DE BASALTOS, NEFELINITAS, etc. (Campos de Calatrava)
719 ROCAS PIROCLÁSTICAS (Campos de Calatrava)
720 ROCAS FREATOMAGMÁTICAS (Campos de Calatrava)

HIERRO | LA PALMA | GOMERA | TENERIFE | GRAN CANARIA | FUERTEVENTURA | LANZAROTE

Simbolos

- Contacto litológico
- Falla
- Falla supuesta
- Cabalgamiento
- Cabalgamiento supuesto
- Límite de masas agua superficial
- Anticlinal
- Anticlinal supuesto
- Sinclinal
- Sinclinal supuesto
- Límite internacional

LEYENDA DE PERMEABILIDAD
1:200.000

LITOLOGÍAS \ PERMEABILIDAD		MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
CON AGUAS UTILIZABLES	CARBONATADAS (POROSAS Y FISURABLES)	C-MA	C-A	C-M	C-B	C-MB
	DETRÍTICAS (Cuaternario) (POROSAS)	Q-MA	Q-A	Q-M	Q-B	Q-MB
	DETRÍTICAS (POROSAS)	D-MA	D-A	D-M	D-B	D-MB
	VOLCÁNICAS (Piroclásticas y lávicas) (POROSAS Y FISURABLES)	V-MA	V-A	V-M	V-B	V-MB
	META-DETRÍTICAS (POROSIDAD POR FRACTURACIÓN)	M-MA	M-A	M-M	M-B	M-MB
	ÍGNEAS (POROSIDAD POR FRACTURACIÓN)	I-MA	I-A	I-M	I-B	I-MB
CON AGUAS NO UTILIZABLES O DE CALIDAD	EVAPORÍTICAS (FISURABLES)	E-MA	E-A	E-M	E-B	E-MB